

Voor meer info raadpleeg:

Dr. Mallet M.
Dr. Ottevaere A.

Dienst Longziekten

055 33 67 61



AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be




AZO/LON/285

Laatst aangepast op 01/10/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Longziekten



BRONCHOSCOPIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



WAT IS HET?

Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij de longarts in de luchtwegen kijkt met een bronchoscoop. De bronchoscoop is een kijkinstrument dat bestaat uit een dunne, buigzame slang met aan het uiteinde een lichtje en een kleine videocamera. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid. Kleine stukjes weefsel kunnen worden weggenomen. Er kan ook slijm of spoelvloeistof worden afgezogen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Een bronchoscopisch onderzoek lijkt op het eerste zicht een vervelend onderzoek. Toch kan het met de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden snel worden uitgevoerd, zonder dat je er al te veel last van ondervindt.

Hoe bereid je je voor?

- Voor het onderzoek moet je nuchter zijn.
- Vertel de arts als je :
 - o allergisch bent voor medicatie, verdoving of latex
 - o zwanger bent
 - o bloedverdünnende medicatie neemt
- Draag geen nagellak of kunstnagels (dit hindert de zuurstofmeting).

Hoe verloopt het onderzoek?

Als je een kunstgebit draagt, wordt er gevraagd om dit uit te doen voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek zit je in een onderzoeksstoel of ligt je in een bed. Jouw hartslag en zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) worden voortdurend gemeten en gevolgd en zo nodig krijg je extra zuurstof toegediend.

Het onderzoek is niet pijnlijk en gebeurt meestal niet onder volledige narcose. De mond en keelholte of neus worden plaatselijk verdoofd met een spray om hoestprikkels te onderdrukken.

Nadat de keel of neus werden verdoofd, plaatst de arts of verpleegkundige een bijtring tussen de tanden zodat je niet op het toestel kan bijten. Dan wordt de bronchoscoop via de mond en de keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. Omdat de bronchoscoop zich tijdens het onderzoek tussen de stembanden bevindt, kan je niet spreken tijdens het onderzoek, maar wel gewoon ademen.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts het slijmvlies van de luchtwegen en kan hij slijmen wegzuigen en weefselstukjes afnemen voor onderzoek in het laboratorium. Ook wordt er soms een spoeling van de kleinere luchtwegen en longblaasjes verricht.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 à 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek word je nog enige tijd opgevolgd tot je je goed genoeg voelt om naar huis te gaan.

Je mag na het onderzoek 2 uur niets eten of drinken om te vermijden dat je je verslikt, zolang de verdoving in de keel niet is uitgewerkt. Nadien drink je eerst een slokje water en als je goed kan slikken, mag je weer eten.

Na het onderzoek kan je last hebben van volgende klachten:

-pijnlijke keel (verdwijnt meestal vanzelf in de loop van de dag)

-bloederige slijmen (verdwijnen ook meestal vanzelf in de loop van de dag)

-koorts

-kortademigheid en hoesten (na longspoeling)

Contacteer de arts (of spoedgevallen in het weekend of 's nachts) als na het onderzoek:

-de koorts blijft aanhouden

-je grotere hoeveelheden bloed ophoest

-kortademigheid of hoesten blijven bestaan.