

Voor meer info raadpleeg:

Afdeling kortverblijf

☎ 055 33 61 00

✉ verpleegpost.a1@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/CHI/287

Laatst aangepast op 02/10/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Kortverblijf



LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE

INFORMATIEBROCHURE BIJ
ONTSLAG

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na het verwijderen van de galblaas.

Medicatie

Paracetamol 1 gr.

Indicatie: bij pijn

Frequentie: max 4 x per dag (om de 6u)

Wondverzorging

Op de dag van het ontslag worden 'Opsite kleefpleisters' aangebracht. Dit zijn waterbestendige pleisters. Deze verbanden hoeven niet dagelijks vervangen te worden. Het is wel raadzaam om de verbanden te vervangen als ze bevuild of nat zijn. Je hoeft bij deze verbandwissel de wonde niet te ontsmetten. Let er wel op dat de wonde rein blijft.

Hechtingen

Na 10 à 12 dagen mogen de hechtingen verwijderd worden door de huisarts.

Verzorging algemeen

Het is raadzaam om nog geen bad te nemen gedurende de eerste 12 dagen. Een douche nemen is wel toegestaan.

Bewegingen

Wij raden een relatieve rust aan. Het is raadzaam de eerste 2 à 3 weken nog geen zware zaken te tillen, waarvan het gewicht hoger is dan 10 kg.

Eten en drinken

Je hoeft geen strikt vetarm dieet te volgen. Het is wel raadzaam om grote hoeveelheden vetten te vermijden. Heb je klachten na gebruik van bepaalde voedingsmiddelen, laat deze dan weg en probeer het later nog eens.

TED-kousen/Fraxiparine

Ter preventie van flebitis is het raadzaam om de steunkousen (TED-kousen) gedurende 10 dagen na de ingreep te dragen.

Bovendien schrijft de arts Fraxiparine® voor. Deze inspuitingen dienen nog 10 dagen gegeven te worden. Je krijgt bij het ontslag een voorschrift van de behandelende arts.

Autorijden

Indien je je capabel voelt en manoeuvres (vb. bruusk remmen) kan uitvoeren, mag je na de ingreep opnieuw met de auto rijden.

Complicaties

Neem contact op met de behandelende arts of huisarts indien je last krijgt van:

- Koorts (> 38,5 °C)
- Abnormale pijn
- Roodheid wonde
- Veel diarree