

HOEVEEL KOST DE TEST?

De prestatie van de arts wordt zo goed als volledig terugbetaald door de mutualiteit. De sonde zelf wordt slechts gedeeltelijk door de mutualiteit terugbetaald.

Je moet een opleg betalen van 84,6 euro voor de sonde zelf + 15,4 euro (= wettelijke afleveringsmarge, 10% van het totale bedrag). Dit komt neer op een factuur van 100,05 euro.

Indien je met de factuur met een bewijs van betaling naar de mutualiteit gaat, kan het zijn dat de mutualiteit nog een deel terugbetaalt.

Voor meer info raadpleeg:

Dr. K. Lecluyse

Dienst Gastro-enterologie

055 33 67 61

✉ inwendige.consultaties@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95
info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/GAS/300
Laatst aangepast op 27/09/2019
V.U.: AZ Oudenaarde

Gastro-
enterologie



IMPEDANTIE MET PH-METRIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be
Volg ons op



PRINCIPE VAN DE TEST

De inhoud van de maag is zuur. Ter hoogte van de slokdarm mag er normaal gezien geen zuur aanwezig zijn. Bij mensen die last hebben van zuur, komt het maagzuur terug tot in de slokdarm.

Met dit onderzoek kan de zuurtegraad in de slokdarm gemeten worden, maar ook of er niet-zuur maagvocht terug naar de slokdarm vloeit.

VOORBEREIDING

Je kan best voor dit onderzoek niet gegeten hebben. Je mag wel wat water of koffie gedronken hebben. Het onderzoek gebeurt ambulantly, maar duurt 24 uur.

De dokter zal je op voorhand zeggen of je bepaalde medicatie moet stoppen voor het onderzoek.

UITVOERING VAN DE TEST

Er wordt een dunne sonde doorheen de neus tot in de slokdarm ingebracht. Soms wordt na het inbrengen van de sonde een röntgenfoto (RX) op de radiologiedienst genomen om te controleren of de sonde goed zit. Dit is echter niet altijd noodzakelijk.

De sonde blijft gedurende 24 uur ter plaatse. Dit is niet pijnlijk, maar prikkelt soms wat in de keel en kan soms lastig zijn tijdens het eten. Aan de sonde hangt een kastje waarop de zuurtegraad in de slokdarm gedurende 24 uur wordt geregistreerd.

Je kan gedurende de volle 24 uur normaal eten en drinken en medicatie innemen. Je eet best voedsel dat gemakkelijk door te slikken is (goed kauwen en veel drinken is belangrijk. Je eet best geen kaassaus, aangezien dat blijft plakken aan de sonde). Het is beter om je normale activiteiten verder te zetten om een zo representatief mogelijk beeld te hebben.

Je duwt op de toetsen van het toestelletje wanneer je eet en drinkt, medicatie inneemt, gaat neerliggen en weer opstaat en wanneer je klachten hebt. Je noteert bijkomende zaken in een dagboek.

De volgende dag kom je terug naar de raadpleging en wordt de sonde verwijderd.

Het resultaat van het onderzoek wordt geanalyseerd en besproken op de raadpleging enkele dagen later.