

Voor meer info raadpleeg:

Dr. K. Lecluyse

Dienst Gastro-enterologie

055 33 67 61

inwendige.consultaties@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/GAS/304

Laatst aangepast op 27/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Gastro-
enterologie



SLOKDARM- MANOMETRIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



WAAROM GEBEURT DEZE TEST?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een probleem met de contractiliteit (het samentrekken) van de slokdarm wordt vermoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkige relaxatie van de onderste kringspier van de slokdarm (achalasia) of bijvoorbeeld om slokdarmspasmen.

PRINCIPE VAN DE TEST

Bij het slikken ontspant eerst de bovenste slokdarmspier. Nadien ontstaan slokdarmbewegingen die volgen op elke slikbeweging. Deze bewegingen kunnen gemeten worden door drukmetingen over het verloop van de slokdarm.

VOORBEREIDING

Je hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt is toegestaan.

Het onderzoek gebeurt op donderdagvoormiddag op de raadpleging en duurt ongeveer 1 uur.

DE UITVOERING VAN DE TEST

Er wordt een dunne sonde doorheen de neus tot in de slokdarm ingebracht. De sonde blijft tijdens het volledige onderzoek aanwezig. Dit is niet pijnlijk.

Het onderzoek gebeurt in zittende houding. De dokter zal je vragen om telkens wat water door te slikken. Bij elke slikbeweging gebeuren er drukmetingen in de slokdarm.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Je zal in totaal zo'n 40 keer moeten slikken.

Het resultaat van het onderzoek is onmiddellijk na het beëindigen bekend en zal je op de raadpleging worden meegedeeld.

