

CONTROLE

Tel. consultatie AZ Oudenaarde:

055 33 66 38

Dr. Dallequin – Dr. De Clercq – Dr.
Ghesquiere

op/...../..... om u

Indien je nog vragen hebt of indien er zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het chirurgisch dagziekenhuis of de huisarts.

Voor meer info raadpleeg:
Dagziekenhuis Heelkunde

055 33 77 00

verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95
info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/GYN/236
Laatst aangepast op 23/09/2019
V.U.: AZ Oudenaarde

Gynaecologie
Verloskunde



INFORMATIE- BROCHURE BIJ ONTSLAG

HYSTEROSCOPIE + CURETTAGE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be
Volg ons op



Geachte mevrouw,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na een hysteroscopie/curettage.

Bij een hysteroscopie kijkt men met behulp van een toestel (= een hysteroscoop) in de baarmoeder. Een hysteroscopie gebeurt via vaginale weg en wordt meestal gevolgd door een curettage, tenzij men enkel een diagnose wil stellen.

Een diagnostische hysteroscopie kan onder lokale verdoving, terwijl een hysteroscopie gevolgd door een curettage steeds onder algemene verdoving gebeurt. Een curettage is het weghalen van de oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies. Daarna wordt het verwijderde weefsel steeds onderzocht op de dienst anatoompathologie. Een hysteroscopie gebeurt meestal via een dagopname: je meldt je op de afgesproken dag nuchter aan op het dagziekenhuis.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Je vermijdt bij thuiskomst best zware inspanningen. Je kan je gewone activiteiten normaal na een tweetal dagen hervatten.

Gedurende enkele dagen kan je wat bloeden en vochtverlies ondervinden. Dit kan gecombineerd zijn met wat menstruatieachtige klachten.

Seksueel contact is weer mogelijk wanneer je geen bloedverlies meer hebt.

HYGIËNE

Gedurende de eerste dagen wordt baden en zwemmen best vermeden.

Het nemen van een douche is geen probleem.

MEDICATIE

Paracetamol 1 gr

Indicatie: bij pijn

Frequentie: zo nodig 4 comprimés per dag (om de 6u).

ETEN EN DRINKEN

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

- mag je iets drinken vanaf:

.....u

- mag je een licht verteerbare maaltijd eten vanaf:

.....u

Je mag geen alcohol nuttigen tot de dag na de ingreep.

COMPLICATIES

Neem contact op met de gynaecoloog indien je last krijgt van:

- toenemende buikpijn
- koorts
- hevig en/of slecht ruikend bloedverlies