


Anesthesie
en pijnkliniek



DE LUMBOSACRALE FACETDENERVATIE (RF)

PIJNKLINIEK

Dr. S. Anssens

Dr. S. Segers

Dr. S. Vanherpen

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op f  in

Bij een facetdenervatie wordt gebruik gemaakt van een radiofrequente stroom die een elektrisch veld en warmte creëert ter hoogte van de zenuwen van het facetgewricht. Dit veroorzaakt een beperkt letsel op de zenuwbaan, waardoor de pijngeleiding onderbroken wordt.

Procedure

Deze behandeling gebeurt in buikligging op de onderzoekstafel. Gezien de bezeniging van een facetgewricht zich over meerdere wervelniveaus uitstrekt, wordt de behandeling steeds op 3 plaatsen uitgevoerd. Nadat de huid eerst ontsmet is ter hoogte van de prikplaatsen, worden deze plaatselijk verdoofd. Onder radioscopische controle worden vervolgens 3 dunne naalden ingebracht tot op de juiste positie. De arts test de correctheid van de naaldposities met elektrische stroompjes. Na het inspuiten van plaatselijke verdoving ter hoogte van de naaldpunt worden de zenuwtjes 1 minuut opgewarmd tot 80°C, waardoor de pijngeleiding onderbroken wordt.

Het uiteindelijk effect kan na 6 à 8 weken beoordeeld worden.

Deze behandeling vergt een **opname in het dagziekenhuis**. Twee uur na de behandeling kan je het ziekenhuis verlaten **onder begeleiding**. Je mag **gedurende 12 uur niet deelnemen aan het verkeer**.

Je hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Een **zwangerschap** moet steeds vooraf gemeld worden.



Thuismedicatie

1. Bloedverdunnende geneesmiddelen:

Voor iedere soort bloedverdunner is een ander beleid nodig voor en na de behandeling. Contacteer steeds je huisarts voor de behandeling, zodat je bloedverdunner tijdig gestopt kan worden.

Cardioaspirine en asaflow:

Deze moeten niet gestopt worden. Vermeld het gebruik van deze geneesmiddelen aan je arts.

Ticlid, Plavix, Clopidogrel:

Deze moeten 7 dagen voor de infiltratie gestopt worden. Er moet geen controlebloedafname gebeuren en geen vervanging met onderhuidse prikjes.

Marevan, Marcoumar, Sintrom:

Deze medicatie moet 7 dagen voor de interventie gestopt worden.

De dag voor de interventie dient ALTIJD een bloedafname te gebeuren met bepaling van PTT en INR. (PTT > 70, INR<1,3).

Na stopzetting van deze medicatie moet altijd substitutie gebeuren door middel van onderhuidse prikjes (Fraxiparine of Clexane). Dit prikje mag niet gegeven worden op de dag van de behandeling, 12 uur na de behandeling mag terug een onderhuids prikje gegeven worden.



Xarelto, Lixiana en Eliquis:

Deze medicatie moet 72 uur voor de behandeling gestopt worden. Er moet geen bloedafname gebeuren. Daags na de behandeling mag deze medicatie herstart worden.

Pradaxa:

GFR > 30ML/MIN: 3 dagen.

GFR < 30ML/MIN: 5 dagen.

Aggrenox: 3 dagen.

Efient: 9 dagen.

Brillique: 7 dagen.

Fraxiparine, clexane en fragmin:

Profylactische dosis: 12 uur.

Therapeutische dosis: 24 uur.

Cave nierfunctie.

Innohep en fraxodi:

Minimum 24 uur.

Arixtra:

Minimum 48 uur.

Brillique, clopidogrel en Efient mogen in principe niet gestopt worden binnen 14 dagen na CVA, binnen een maand na perifere vaatthrombose en binnen 6 weken tot 3 maanden na PCI of Bare metal coronaire stenting.



2. Antibiotica:

Gebruik van antibiotica en de reden waarom ze genomen moeten worden, meld je aan de arts.

3. Overige medicatie:

De overige thuismedicatie mag je verder innemen.

Allergieën

Als je een allergie hebt, meld je dit **ALTIJD VOOR DE BEHANDELING** aan de arts.

Naast medicatie wordt in de pijnkliniek vaak gebruik gemaakt van ontsmettingsstof, contraststof en kleefpleisters; ook allergieën hiervoor moet je steeds vermelden.

Koorts of ziekte

Bij een temperatuur > 37.5 °C of bij ziekte wordt de behandeling **NIET UITGEVOERD**.

Gelieve in deze situatie je afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te vragen.



Bijwerkingen

Er kan een **verdoofd gevoel** optreden in het huidgebied dat door de behandelde zenuw bezenuwd wordt. Meestal verdwijnt dit na enkele maanden.

Meestal treedt na een RF-behandeling **nabehandelingspijn** op die een 2-tal weken kan aanhouden; hiervoor mag je gerust een klassieke pijnstiller innemen (paracetamol, ibuprofen...)

Complicaties

Deze komen **zeer zelden** voor.

1. Lokale infectie
2. Lokale bloeding





Voor bijkomende inlichtingen en/of afspraak:

Dr. S. Anssens

Dr. S. Segers

Dr. S. Vanherpen

Artsen pijnkliniek

✉ pijnkliniek@azoudenaarde.be

✍ Afspraak: 055/33.63.97



AZ Oudenaarde vzw

AZ OUDENAARDE
VZW



Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be