

CONTROLE

Afspraken AZ Oudenaarde:

055 33 63 99

PIJNKLINIEK

Afspraak

Op/...../.....

Om uur

Indien je nog vragen hebt of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het chirurgisch dagziekenhuis, de huisarts of de spoedopname.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

055 33 77 00

verpleegpost.d0@azoudenaarde.be



AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95


info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/PIJ/264
23/09/2019
V.U. AZ Oudenaarde

Anesthesie
en pijnkliniek



INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

WORTELBLOK

PIJNKLINIEK

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Om de genezing te versnellen, is het aangeraden de volgende dag geen rug -of nekbelastende inspanningen (bijvoorbeeld stofzuigen, tuinwerk,...) uit te voeren.

Bedrust hoeft niet.

COMPLICATIES

Neveneffecten van de gebruikte medicatie (cortisone) treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar bij uitzondering kunnen volgende bijwerkingen ontstaan:

- Overgevoeligheid
- Roodheid en zwelling in het gezicht
- Ophouden van vocht
- Hoge bloeddruk
- Hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte
- Last aan de maag
- Slapeloosheid
- Lichthoofdigheid
- Heropflakking van de pijn

Neveneffecten door de gebruikte techniek

- Tijdelijke verergerde zenuwontsteking met stijfheid en stramheid in de rug en arm of been
- Hoofdpijn door lekkend ruggenmerg
- Bloeding rond het ruggenmerg indien je bloedverduunners gebruikt

In zeldzame gevallen kan dit het volgende veroorzaken:

- ➔ Toenemende zenuwuitval met gevoelsstoornissen
- ➔ Urinaire en/of stoelgangproblemen
- ➔ Infectie rond het ruggenmerg met koorts en nekstijfheid.

Gelieve hierbij de behandelende arts of de spoedopname te contacteren.

MEDICATIE

De voorgeschreven pijnmedicatie vóór de ingreep mag je verder innemen volgens voorschrift 10 tot 14 dagen na de behandeling.

Indien je bloedverdunnende medicatie neemt, mag deze medicatie herstart worden in samenspraak met de arts.

Bij problemen kan je contact opnemen met de behandelende arts of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis:

Dr. S. Segers: 055/33 67 01

Dr. S. Vanherpen: 055/33 67 36

Dagziekenhuis heelkunde: 055/33 77 00