

Voor meer info raadpleeg:
Spoedgevallendienst

055 33 61 11



AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95
info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/SPO/388
22/10/2019
V.U. AZ Oudenaarde

Spoed



RAADGEVINGEN BIJ HERSENSCHUDDING WEKADVIES

Informatie voor patiënten



www.azoudenaarde.be
Volg ons op



Jijzelf, jouw kind of familielid is zopas op de dienst spoedgevallen verzorgd wegens een schedeltrauma. Mogelijk heb je een hersenschudding opgelopen. Er is echter geen onmiddellijke reden tot opname.

Het is echter van belang dat jij/jouw kind/familielid gedurende de eerste 24 uur niet alleen is/bent. Het is altijd mogelijk dat er zich nieuwe symptomen ontwikkelen die verdere onderzoeken of een eventuele opname noodzakelijk maken.

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS DE EERSTE 24 UUR :

- Er blijft constant iemand bij jou/de patiënt in huis
- Je/de patiënt mag slapen zoveel als je/hij /zij wil
- Je/de patiënt wordt overdag elke 2 uur gewekt en volgende zaken worden gecontroleerd :
 - Ogen openen (pupillen moeten gelijk zijn)
 - Juist antwoorden op een eenvoudige vraag
 - Juist uitvoeren van een eenvoudig bevel
- 's Nachts word je/wordt de patiënt elke 4 uur gewekt en gecontroleerd zoals overdag.

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS DE VOLGENDE DAGEN:

Let erop dat je/de patiënt niet teveel leest, tv kijkt of in fel (zon)licht loopt. Dit om langdurige hoofdpijn te vermijden.

Indien je/de patiënt na één week nog hoofdpijn hebt/heeft, maak dan een afspraak met de specialist -neuroloog of contacteer de huisarts.

Kom onmiddellijk naar het ziekenhuis (dienst spoedopname) of **bel de dienst 112** als volgende zaken optreden :

- Ongewone sufheid of verwardheid
- Patiënt is moeilijk wakker te maken
- Aanhoudend braken
- Blijvende ernstige hoofdpijn
- Nekstijfheid
- Verlies van bloed of helder vocht langs de neus of de oren
- Nieuwe krachtsvermindering in arm en been
- Stuipen (= schokken van een lichaamsdeel of het gehele lichaam)
- Ongelijke pupillen (de ene groot en de andere klein)

Je mag eten en drinken zoals gewoonlijk als er eetlust is. Forceer dit echter niet! Vermijd alcoholische dranken, zeker de eerste drie dagen.

Gebruik de eerste 24 uur geen kalmerings- of slaapmiddelen, verdovende middelen, pijnstillers met aspirine of codeïne de eerste 24 uur. Als je een pijnstiller nodig hebt, gebruik best paracetamol (Dafalgan).