

CONTROLE

Tel. secretariaat urologie:

055/33.66.38

Dr. G. TRUIJEN

Dr. B. CASIER

Verwacht jou op

...../...../.....

Om uur.

Indien je nog vragen hebt of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het dagziekenhuis heelkunde of de huisarts.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

☎ 055 33 77 00

✉ verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/URO/268

Laatst aangepast op 23/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Urologie



INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

VARICOCOELE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mijnheer,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

Een **varicocoele** is een spatader aan het scrotum of de balzak. Een varicocoele treedt voornamelijk op bij mannen tussen 14 en 25 jaar en komt bij ongeveer 15% van alle mannen voor. Aan de linkerkant van het lichaam stroomt het aderlijk bloed uit de balzak terug via een lange ader en de nierader naar het hart. De kleppen die ervoor zorgen dat het bloed slechts één richting uitstroomt in de ader, werken niet meer goed. Dit zorgt ervoor dat een relatief grote hoeveelheid bloed via de aders terug kan stromen naar de zaadballen. Dit bloed is op lichaamstemperatuur, waardoor de zaadballen te warm worden. Dit heeft invloed op de vruchtbaarheid.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Het is aanbevolen om bij thuiskomst zo veel mogelijk rust te houden.

Om zwelling rond de operatiestreek te voorkomen, breng je een koudebron aan. Dit kan een koelelement zijn uit een frigobox, ijsblokjes in een plastic zak of een coldpack. Breng nooit onverpakt en rechtstreeks een koudebron aan op de blote huid!

Gebruik een strakke onderbroek of zwembroek gedurende de eerste 48 u. Dit geeft extra steun, werkt pijnverlichtend en houdt het verband ter plaatse.

ETEN EN DRINKEN

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Dit betekent dat de anesthesist beslist wanneer je mag eten en drinken.

Drinken:uur

Eten:uur

MEDICATIE

Paracetamol 1 g (Dafalgan® - Perdolan®)

Indicatie: bij pijn

Frequentie: maximaal 4 x per dag

Diclofenac (Voltaren®) of Ibuprofen (Brufen®)

Indicatie: bij pijn, indien paracetamol 1 g niet volstaat.

Frequentie: maximaal 2 x per dag

Deze medicatie is op voorschrift van de arts.

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN

De huid rondom de wonde is de eerste dagen wat blauw, dit is normaal. De balzak kan gedurende enkele dagen gezwollen zijn.

WONDVERZORGING

Houd het wondje proper en droog. De dag na de ingreep mag je opnieuw douchen.

Na 1 à 2 weken is de wonde volledig genezen, dan mag je baden en is sporten (inclusief zwemmen en seksuele betrekkingen) weer mogelijk.

De wondhechtingen moeten niet verwijderd worden. De wonde heelt snel en het litteken is na 6 maanden meestal niet meer terug te vinden.

Wij wensen jou een spoedig herstel!