

WAAROP LETTEN ALS BEZOEKER?

Tijdens de isolatie is bezoek mogelijk.

Bij het verlaten van de kamer worden de handen gewassen met water en zeep en vervolgens ontsmet met handalcohol.

Help je de patiënt verzorgen, draag dan een beschermerschort die op de kamer hangt.

Maak geen gebruik van het toilet van de patiënt. Vermijd om op het bed te gaan zitten.

Wanneer je meerdere patiënten bezoekt binnen het ziekenhuis, plan dan het bezoek bij de besmette patiënt het laatst.

In zorginstellingen en zo ook in AZ Oudenaarde, bestaat de doelstelling erin om de verspreiding van deze bacterie te beperken.

Om dit doel te bereiken, is de eenvoudige maar doeltreffende medewerking van iedereen nodig:

Een goede handhygiëne toepassen!

Voor meer info raadpleeg:

Team ziekenhuishygiëne

Marissa De Meester

☎ 055 33 66 62

Delphine De Roose

☎ 055 33 66 43

Apr. Biol. Peter Ghys

☎ 055 33 67 32

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/ZHH/210

Laatst aangepast op 19/01/2022

V.U.: AZ Oudenaarde

Ziekenhuis-
hygiëne



CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



WAT IS CLOSTRIDIUM DIFFICILE?

Clostridium is een bacterie die kan voorkomen in de darm. Bij een verzwakte weerstand van de darm, vaak door het innemen van antibiotica, zal het aantal bacteriën vermeerderen en kunnen gifstoffen aangemaakt worden die de darmwand aantasten.

WAT ZIJN DE TEKENEN OF DE SYMPTOMEN VAN EEN CLOSTRIDIUM DIFFICILE-INFECTIE?

Een darmontsteking, ontstaan door Clostridium difficile, veroorzaakt buikpijn, darmkrampen, koorts en een waterige diarree. Er kunnen ook slijmen en bloed in de ontlasting terug te vinden zijn.

Om zeker te zijn dat het om een infectie met Clostridium gaat, zal er een staal stoelgang geanalyseerd worden in het labo. Bevat dat staal gifstoffen (toxines), dan is het resultaat positief en moeten er bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen worden door de ziekenhuismedewerkers.

WAT TE DOEN ALS PATIENT?

Vanaf het begin van de diarree tot het einde ervan kan Clostridium difficile zeer gemakkelijk doorgegeven worden aan andere patiënten. De overdracht kan door ofwel menselijk contact, voornamelijk via de handen, ofwel door gemeenschappelijk gebruik van materialen of sanitair.

De patiënt kan een waardevolle bijdrage leveren om het vermenigvuldigen van deze kiemen te voorkomen door:

- Op de kamer te blijven en de deur dicht te houden.
- De kledij zo mogelijk dagelijks te verversen, en in elk geval wanneer ze bevuild is met stoelgang.
- Gedragen kledij in een gesloten plastic zak te bewaren en deze zo vlug mogelijk mee naar huis geven om te wassen. Het wassen gebeurt op de hoogst mogelijke temperatuur.
- De handen te wassen telkens je naar het toilet bent geweest, maar ook voor de maaltijd en wanneer je de kamer verlaat.

WELKE VOORZORGSMATREGELEN NEMEN DE ZIEKENHUISMEDEWERKERS?

- Je verblijft op een eenpersoonskamer in isolatie.
- Aan de kamerdeur wordt voor de bezoekers een document gehangen met de te nemen maatregelen.
- Het linnen en afval worden gescheiden verzameld van dat van andere patiënten.
- Alle ziekenhuismedewerkers wassen en ontsmetten de handen bij het verlaten van de kamer. Bij het betreden van de kamer worden de handen ontsmet.
- Alle ziekenhuismedewerkers dragen handschoenen en een overschoort.
- Jouw kamer wordt dagelijks gereinigd, het sanitair wordt dagelijks gereinigd en ontsmet.

TOT SLOT

Deze folder geeft enkel algemene informatie. Bijkomende of specifieke informatie, aangepast aan jouw situatie, wordt gegeven door de behandelende arts of door de verantwoordelijke verpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.