

CONTROLE

Tel consultatie AZ Oudenaarde:

055 33 66 38

Dr. Dallequin – Dr. Van Baelen

Dr. De Clercq – Dr. Ghesquiere

op/...../..... om u

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

T 055 33 77 00

Verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Wij wensen u een spoedig herstel!

INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

NA CONISATIE VAN DE
BAARMOEDERHALS

- Patiëntinformatie -

AZO/CDZ/235
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

Geachte mevrouw,

Graag geven wij u enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na een conisatie.

Een conisatie is een kleine operatie waarbij de gynaecoloog een stukje weefsel van de baarmoedermond wegneemt.

Deze ingreep gebeurt meestal wanneer er sprake is van een verstoorde opbouw van weefselcellen (= dysplasie, veroorzaakt door het HPV virus: humaan papillomavirus; wordt overgedragen tijdens seksuele betrekkingen).

Om een verdere woekering van deze cellen te voorkomen, neemt de gynaecoloog het zieke slijmvlies weg.

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Ze vindt plaats in het dagziekenhuis. U hoeft dus niet te overnachten in het ziekenhuis.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Het is mogelijk dat de arts u een voorschrift opmaakt om gedurende 7 dagen Dalacin® Crème vaginaal in te brengen bij het slapengaan.

Het is normaal om gedurende enkele dagen tot een paar weken wat waterig of bloederig vaginaal verlies te ondervinden.

In deze periode vermijdt u best zware inspanningen en seksuele betrekkingen: deze kunnen immers een hevigere bloeding uitlokken.

Wordt het vaginaal verlies etterig of slecht ruikend dan dient u de behandelende arts te contacteren.

Een controleraadpleging na 4 weken is aangewezen.

MEDICATIE

Paracetamol 1 g

Indicatie: bij pijn

Frequentie: zo nodig 4 comprimés per dag

(om de 6 u).

ETEN EN DRINKEN

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

- mag u iets drinken vanaf:

.....u

- mag u een licht verteerbare maaltijd eten vanaf:

.....u

U mag geen alcohol nuttigen tot de dag na de ingreep.

COMPLICATIES

Neem contact op met uw gynaecoloog indien u last krijgt van:

- toenemende buikpijn
- koorts
- hevig en/of slecht ruikend bloedverlies
- etterig vaginaal verlies