

CONTROLE

Tel consultatie AZ Oudenaarde:

055 33 66 38

Dr. Dallequin – Dr. Van Baelen

Dr. De Clercq – Dr. Ghesquiere

op/...../..... om u

Indien u nog vragen hebt of indien er zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts, de verpleegkundigen van het chirurgisch dagziekenhuis of uw huisarts.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

T 055 33 77 00

Verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Wij wensen u een spoedig herstel!

INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

HYSTEROSCOPIE + CURETTAGE

- Patiëntinformatie -

AZO/CDZ/236
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

U vermijdt bij thuiskomst best zware inspanningen. U kan uw gewone activiteiten normaal na een tweetal dagen hervatten.

Gedurende enkele dagen kan u wat bloed- en vochtverlies ondervinden. Dit kan gecombineerd zijn met wat menstruatieachtige klachten.

Seksueel contact is weer mogelijk, wanneer u geen bloedverlies meer hebt.

HYGIËNE

Gedurende de eerste dagen wordt baden en zwemmen best vermeden.

Het nemen van een douche is geen probleem.

MEDICATIE

Paracetamol 1 gr

Indicatie: bij pijn

Frequentie: zo nodig 4 comprimés per dag (om de 6u).

ETEN EN DRINKEN

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

- mag u iets drinken vanaf:

.....u

- mag u een licht verteerbare maaltijd eten vanaf:

.....u

U mag geen alcohol nuttigen tot de dag na de ingreep.

COMPLICATIES

Neem contact op met uw gynaecoloog indien u last krijgt van:

- toenemende buikpijn
- koorts
- hevig en/of slecht ruikend bloedverlies

Geachte mevrouw,

Graag geven wij u enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na een hysteroscopie / curettage.

Bij een hysteroscopie kijkt men met behulp van een toestel (=een hysteroscoop) in de baarmoeder. Een hysteroscopie gebeurt via vaginale weg en wordt meestal gevolgd door een curettage, tenzij men enkel een diagnose wil stellen.

Een diagnostische hysteroscopie kan onder lokale verdoving, terwijl een hysteroscopie gevolgd door een curettage steeds onder algemene verdoving gebeurt. Een curettage is het weghalen van de oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies. Daarna wordt het verwijderde weefsel steeds onderzocht op de dienst anatoompathologie. Een hysteroscopie gebeurt meestal via een dagopname: u meldt zich op de afgesproken dag nuchter aan op het dagziekenhuis.