

CONTROLE

Afspraken AZ Oudenaarde:

055 33 67 45

PIJNKLINIEK

Afspraak

Op/...../.....

Om uur

Indien u nog vragen heeft of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw behandelende arts, de verpleegkundigen van het chirurgisch dagziekenhuis, uw huisarts of de spoedopname.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

T 055 33 77 00

Verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

CERVICALE FACET INFILTRATIE
PIJNKLINIEK

- Patiëntinformatie -

AZO/CDZ/251
V1.0



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag geven wij u enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Om de genezing te versnellen, is het aangeraden de volgende dag geen rug -of nekbelastende inspanningen (bijvoorbeeld stofzuigen, tuinwerk,...) uit te voeren.

Bedrust hoeft niet.

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN

Verdoving van de arm. Dit effect is niet verontrustend en zal ten laatste de ochtend na de infiltratie verdwenen zijn. Indien deze klachten toch aanhouden, gelieve uw behandelende arts te contacteren.

COMPLICATIES

Neveneffecten van de gebruikte medicatie (cortisone) treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar bij uitzondering kunnen volgende bijwerkingen ontstaan:

- Overgevoeligheid
- Roodheid en zwelling in het gezicht
- Ophouden van vocht
- Hoge bloeddruk
- Hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte
- Last aan de maag
- Slapeloosheid
- Lichthoofdigheid
- Heropflakking van de pijn

Neveneffecten van de gebruikte techniek

- Tijdelijke pijn en/of gevoelsvermindering op de plaats van de inspuiting.
- Reactie op de lokale verdoving: daling van de bloeddruk, allergische symptomen.
- Bloeding door het raken van een bloedvatje. Dit vormt geen probleem wanneer u geen bloedverdunders neemt of deze tijdig hebt stopgezet.
- Kleine kans op een infectie en zenuwbeschadiging.

MEDICATIE

Uw voorgeschreven pijnmedicatie vóór de ingreep mag u verder innemen volgens voorschrift 10 tot 14 dagen na de ingreep.

Indien u bloedverdünnende medicatie neemt, mag deze medicatie herstart worden in samenspraak met uw arts.

Bij problemen kunt u contact opnemen met uw behandelende arts of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis:

Dr. S. Segers: 055/33 67 01

Dr. S. Vanherpen: 055/33 67 36

Dagziekenhuis heelkunde: 055/33 77 00