

HOEVEEL KOST DE TEST?

De prestatie van de arts wordt zo goed als volledig terugbetaald door de mutualiteit. De sonde zelf wordt slechts gedeeltelijk door de mutualiteit terugbetaald.

U dient een opleg te betalen van 84,6 euro voor de sonde zelf + 15,4 euro (= wettelijke afleveringsmarge, 10% van het totale bedrag). Dit komt neer op een factuur van 100,05 euro.

Indien u met uw factuur met een bewijs van betaling naar de mutualiteit gaat, kan het zijn dat de mutualiteit u nog een deel terugbetaalt.

Voor meer info raadpleeg:

Dr. K. Lecluyse

Dienst Gastro-enterologie

T 055 33 67 61

F 055 33 67 62

E inwendige.consultaties@azoudenaarde.be

IMPEDANTIE MET PH-METRIE

- Patiëntinformatie -

AZO/GAS/300
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

PRINCIPE VAN DE TEST

De inhoud van de maag is zuur. Ter hoogte van de slokdarm mag er normaal gezien geen zuur aanwezig zijn. Bij mensen die last hebben van zuur, komt het maagzuur terug tot in de slokdarm.

Met dit onderzoek kan de zuurtegraad in de slokdarm gemeten worden, maar ook of er niet-zuur maagvocht terug naar de slokdarm vloeit.

VOORBEREIDING

U kan best voor dit onderzoek niet gegeten hebben. U mag wel wat water of koffie gedronken hebben. Het onderzoek gebeurt ambulantly, maar duurt 24 uur.

De dokter zal u op voorhand zeggen of u bepaalde medicatie moet stoppen voor het onderzoek.

UITVOERING VAN DE TEST

Er wordt een dunne sonde doorheen de neus tot in de slokdarm ingebracht. Soms wordt na het inbrengen van de sonde een röntgenfoto (RX) op de radiologiedienst genomen om te controleren of de sonde goed zit. Dit is echter niet altijd noodzakelijk.

De sonde blijft gedurende 24 uur ter plaatse. Dit is niet pijnlijk, maar prikkelt soms wat in de keel en kan soms lastig zijn tijdens het eten. Aan de sonde hangt een kastje waarop de zuurtegraad in de slokdarm gedurende 24 uur wordt geregistreerd.

U kan gedurende de volle 24 uur normaal eten en drinken en uw medicatie innemen. U eet best voedsel dat gemakkelijk is door te slikken (goed kauwen en veel drinken is belangrijk. U eet best geen kaassaus, aangezien dat blijft plakken aan de sonde). Het is beter om uw normale activiteiten verder te zetten om een zo representatief mogelijk beeld te hebben.

U duwt op de toetsen van het toestelletje wanneer u eet en drinkt, medicatie inneemt, gaat neerliggen en terug opstaat en wanneer u klachten heeft. U noteert bijkomende zaken in een dagboek.

De volgende dag komt u terug naar de raadpleging en wordt de sonde verwijderd.

Het resultaat van het onderzoek wordt geanalyseerd en besproken op de raadpleging enkele dagen later.