

Voor meer info raadpleeg:
Dagziekenhuis inwendige ziekten
Verpleegkundigen

T 055 33 69 00

E Verpleegpost.d2@azoudenaarde.be

INFORMATIE THUISVERPLEGING

HET AFSLUITEN VAN EEN
POORTKATHETER

- Informatie -

AZO/IDZ/319
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

ALGEMENE INFORMATIE

Deze informatiebrochure beschrijft de werkwijze voor het afsluiten van een poortkatheter na toediening van medicatie in de thuisituatie.

De poortkatheter kan worden afgesloten door de professionele zorgverleners in de thuiszorg of door de huisarts.

WERKWIJZE

- ❖ Ontsmet uw handen met handalcohol.
- ❖ Neem de flacon met NaCl 0,9% 20 ml en trek deze op in een spuit. Leg deze klaar voor gebruik.
- ❖ Doe zo nodig niet-steriele handschoenen aan.
- ❖ Sluit de klem op de poortkatheterlijn.
- ❖ Ontkoppel de eventuele toediening (TPN, Infusorpomp,...) die via de poortkatheter is aangesloten.
- ❖ Neem de spuit gevuld met NaCl 0,9% en koppel deze aan de Grippernaald.

- ❖ Zet de klem open en spuit daarna pulserend met NaCl 0,9% 20 ml. Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3ml traag wordt ingespoten.
- ❖ Verwijder het verband van de Grippernaald.
- ❖ Fixeer de poortkatheter tussen duim en wijsvinger en middenvinger en trek de Grippernaald voorzichtig uit de poortkatheter.



- ❖ Druk met de depper op de punctieplaats.
- ❖ Breng een kleefpleister aan.

AANDACHTSPUNTEN

- ❖ Laat uw patiënt tijdig weten wanneer er een voorschrift nodig is, zo kan de patiënt een voorschrift vragen aan zijn behandelende arts.
- ❖ Zorg dat het nodige materiaal aanwezig is.
- ❖ Bij problemen kan u altijd contact opnemen met de afdeling waar de patiënt zijn therapie heeft gekregen.