

Voor meer info raadpleeg:

Dr. Mallet M.

Dr. Ottevaere A.

Dienst Longziekten

T 055 33 67 61

F 055 33 67 62

HISTAMINE PROVOCATIE TEST

- Patiëntinformatie -

AZO/INW/183
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

HISTAMINE PROVOCATIETEST

Met deze test meet men de overgevoeligheid van de luchtwegen. U krijgt histamine (een prikkelende, maar onschadelijke stof) via verneveling toegediend. Deze stof kan een luchtwegvernauwing veroorzaken.

Vorbereiding

- Rook niet gedurende 4 uur voor het onderzoek.
- Bepaalde geneesmiddelen mag u niet nemen voor het onderzoek. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte.

Verloop van het onderzoek

Duur: 60 minuten

- De verpleegster controleert uw basislongfunctie (spirometrie) voor de start van de test.
- Daarna moet u verschillende concentraties van dampen met histamine inademen.
- Na iedere verneveling wordt de basislongfunctie gemeten.
- Het onderzoek wordt beëindigd als alle concentraties zijn toegediend of als er een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt.
- Na het onderzoek krijgt u een luchtwegverwijder via een voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer).

Aan de hand van de reactie van de luchtwegen kan bepaald worden of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt.

Veiligheid

De provcatietest is een veilig onderzoek. Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn of prikkelhoest ervaren.

Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

Nevenwerkingen

Reacties van de luchtwegen zijn mogelijk. Deze worden met medicijnen behandeld.

Een lichte benauwdheid tijdens en na het onderzoek is normaal. U krijgt een luchtwegverwijder die dit verhelpt.