

Voor meer info raadpleeg:

Dr. Mallet M.

Dr. Ottevaere A.

Dienst Longziekten

T 055 33 67 61

F 055 33 67 62

BRONCHOSCOPIE

- Patiëntinformatie -

AZO/INW/285
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek, waarbij de longarts in de luchtwegen kijkt met een bronchoscoop. De bronchoscoop is een kijkinstrument dat bestaat uit een dunne, buigzame slang met een aan het uiteinde een lichtje en een kleine videocamera. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid. Kleine stukjes weefsel kunnen worden weggenomen. Er kan ook slijm of spoelvoeistof worden afgezogen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Een bronchoscopisch onderzoek lijkt op het eerste zicht een vervelend onderzoek. Toch kan het met de huidige instrumenten en verdovingsmogelijkheden snel worden uitgevoerd, zonder dat u er al te veel last van ondervindt.

Hoe bereidt u zich voor?

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn.
- Vertel het uw arts als u :
 - o allergisch bent voor medicatie, verdoving of latex
 - o zwanger bent
 - o bloedverdünnende medicatie neemt
- Draag geen nagellak of kunstnagels (dit hindert de zuurstofmeting).

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u een kunstgebit draagt, wordt u gevraagd om dit uit te doen voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek, zit u in een onderzoeksstoel of ligt u in een bed. Uw hartslag en zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) worden voortdurend gemeten en gevolgd en zo nodig krijgt u extra zuurstof toegediend.

Het onderzoek is niet pijnlijk en gebeurt meestal niet onder volledige narcose. De mond en keelholte of neus, worden plaatselijk verdoofd met een spray om hoestprikkels te onderdrukken.

Nadat de keel of neus werden verdoofd, plaatst de arts of verpleegkundige een bijtring tussen de tanden, zodat u niet op het toestel kan bijten. Dan wordt de bronchoscoop via de mond en de keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. Omdat de bronchoscoop zich tijdens het onderzoek tussen de stembanden bevindt, kan u niet spreken tijdens het onderzoek, maar wel gewoon ademen.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts het slijmvlies van de luchtwegen en kan hij slijmen wegzuigen en weefselstukjes afnemen voor onderzoek in het laboratorium. Ook wordt er soms een spoeling van de kleinere luchtwegen en longblaasjes verricht.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 à 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u nog enige tijd opgevolgd tot u zich goed genoeg voelt om naar huis te gaan.

U mag na het onderzoek 2 uur niets eten of drinken om te vermijden dat u zich verslikt, zolang de verdoving in de keel niet is uitgewerkt. Nadien drinkt u eerst een slokje water en als u goed kan slikken, mag u weer eten.

Na het onderzoek kan u last hebben van volgende klachten:

-pijnlijke keel (verdwijnt meestal vanzelf in de loop van de dag.)

-bloederige slijmen (verdwijnen ook meestal vanzelf in de loop van de dag.)

-koorts

-kortademigheid en hoesten (na longspoeling)

Contacteer uw arts (of spoedgevallen in het weekend of 's nachts) als na het onderzoek:

-de koorts blijft aanhouden

-u grotere hoeveelheden bloed ophoest

-kortademigheid of hoesten blijven bestaan.