

Voor meer info raadpleeg:

Afdeling kortverblijf

T 055 33 61 00

E verpleegpost.a1@azoudenaarde.be

LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE

INFORMATIEBROCHURE BIJ
ONTSLAG

- Patiëntinformatie -

AZO/KVB/287
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag geven wij u enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na het verwijderen van de galblaas.

Medicatie

Paracetamol 1 gr.

Indicatie: bij pijn

Frequentie: max 4 X per dag (om de 6u)

Wondverzorging

Op de dag van uw ontslag worden 'Opsite kleefpleisters' aangebracht. Dit zijn waterbestendige pleisters. Deze verbanden hoeven niet dagelijks vervangen te worden. Het is wel raadzaam de verbanden te vervangen als ze bevuild of nat zijn. U hoeft bij deze verbandwissel de wonde niet te ontsmetten. Let er wel op dat de wonde rein blijft.

Hechtingen

Na 10 à 12 dagen mogen de hechtingen verwijderd worden door de huisarts.

Verzorging algemeen

Het is raadzaam nog geen bad te nemen gedurende de eerste 12 dagen. Een douche nemen is wel toegestaan.

Bewegingen

Wij raden een relatieve rust aan. Het is raadzaam de eerste 2 à 3 weken nog geen zware zaken te tillen, waarvan het gewicht hoger is dan 10 kg.

Eten en drinken

U hoeft geen strikt vetarm dieet te volgen. Het is wel raadzaam om grote hoeveelheden vetten te vermijden. Heeft u klachten na gebruik van bepaalde voedingsmiddelen, laat deze dan weg en probeer het later nog eens.

TED kousen / Fraxiparine

Ter preventie van flebitis is het raadzaam uw steunkousen (TED kousen) gedurende 10 dagen na de ingreep te dragen.

Bovendien schrijft de arts Fraxiparine® voor. Deze inspuitingen dienen nog 10 dagen gegeven te worden. U ontvangt bij het ontslag een voorschrift van uw behandelend arts.

Autorijden

Indien u zich capabel voelt en manoevers (vb. brusk remmen) kan uitvoeren, mag u na de ingreep opnieuw met de auto rijden.

Complicaties

Neem contact op met uw behandelend arts of huisarts indien u last krijgt van:

- Koorts (> 38,5 °C)
- Abnormale pijn
- Roodheid wonde
- Veel diarree