

DE LUMBOSACRALE FACETDENERVATIE

PIJNKLINIEK

ARTSEN

Dr. S. Segers
Dr. S. Vanherpen
Dr. S. Anssens

- Patiëntinformatie -

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

De lumbosacrale facetdenervatie (rf)

Bij een facetdenervatie wordt gebruik gemaakt van een radiofrequente stroom die een elektrisch veld en warmte creëert ter hoogte van de zenuwen van het facetgewricht. Dit veroorzaakt een beperkt letsel op de zenuwbaan, waardoor de pijngeleiding onderbroken wordt.

Procedure

Deze behandeling gebeurt in buikligging op de onderzoekstafel. Gezien de bezenewing van een facetgewricht zich over meerdere wervelniveaus uitstrekt, wordt de behandeling steeds op 3 plaatsen uitgevoerd. Nadat de huid eerst ontsmet is ter hoogte van de prikplaatsen, worden deze plaatselijk verdoofd. Onder radioscopische controle worden vervolgens 3 dunne naalden ingebracht tot op de juiste positie. De arts test de correctheid van de naaldposities met elektrische stroompjes. Na het inspuiten van plaatselijke verdoving ter hoogte van de naaldpunt worden de zenuwtjes 1 minuut opgewarmd tot 80°C, waardoor de pijngeleiding onderbroken wordt.

Het uiteindelijke effect kan na 6 à 8 weken beoordeeld worden.

Deze behandeling vraagt een opname in het **dagziekenhuis**. Een uur na de behandeling kan U **het ziekenhuis verlaten onder begeleiding**. **U mag zich gedurende 12 uur niet in het verkeer begeven.**

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Een **zwangerschap** moet vooraf aan de arts gemeld worden.

Thuismedicatie

1. Bloedverdunnende geneesmiddelen:

Voor iedere soort bloedverdunner is een ander beleid nodig voor en na de behandeling. Contacteer steeds uw huisarts voor de behandeling, zodat uw bloedverdunner tijdig gestopt kan worden.

Cardioaspirine en asaflow:

Deze moeten niet gestopt worden. Vermeld het gebruik van deze geneesmiddelen aan uw arts.

Ticlid, Plavix, Clopidogrel:

Deze moeten 7 dagen voor de infiltratie gestopt worden. Er moet geen controlebloedafname gebeuren en geen vervanging met onderhuidse prikjes.

Marevan, Marcoumar, Sintrom:

Deze medicatie moet 7 dagen voor de interventie gestopt worden.

De dag voor de interventie dient ALTIJD een bloedafname te gebeuren met bepaling van PTT en INR. (PTT > 70, INR<1,3).

Na stopzetting van deze medicatie moet altijd substitutie gebeuren door middel van onderhuidse prikjes (Fraxiparine of Clexane). Dit prikje mag niet gegeven worden op de dag van de behandeling, 12 uur na de behandeling mag terug een onderhuids prikje gegeven worden.

Xarelto, Lixiana en Eliquis:

Deze medicatie moet 72 uur voor de behandeling gestopt worden. Er moet geen bloedafname gebeuren. Daags na de behandeling mag deze medicatie herstart worden.

Pradaxa:

GFR > 30ML/MIN: 3 dagen.

GFR < 30ML/MIN: 5 dagen.

Aggrenox: 3 dagen.

Efient: 9 dagen.

Brillique: 7 dagen.

Fraxiparine, clexane en fragmin:

Profylactische dosis: 12 uur.

Therapeutische dosis: 24 uur.

Cave nierfunctie.

Innohep en fraxodi:

Minimum 24 uur.

Arixtra:

Minimum 48 uur.

Brilique, clopidogrel en Efient mogen in principe niet gestopt worden binnen 14 dagen na CVA, binnen een maand na perifere vaatthrombose en binnen 6 weken tot 3 maanden na PCI of Bare metal coronaire stenting.

2. Antibiotica:

Gebruik van antibiotica en de reden waarom ze genomen moeten worden, meldt u aan de arts.

3. Overige medicatie:

De overige thuismedicatie mag u verder innemen.

Allergieën

Indien u een allergie heeft, dient u dit **ALTIJD VOOR DE BEHANDELING** aan de arts te melden.

Naast medicatie wordt in de pijnkliniek vaak gebruik gemaakt van ontsmettingsstof, contraststof en kleefpleisters; ook allergieën hiervoor dient u steeds te vermelden.

Koorts of ziekte

Bij een temperatuur > 37.5 °C of bij ziekte wordt de behandeling **NIET UITGEVOERD**.

Gelieve in deze situatie uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te vragen.

Bijwerkingen

Er kan een **verdoofd gevoel** optreden in het huidgebied dat door de behandelde zenuw bezenuwd wordt. Meestal verdwijnt dit na enkele maanden.

Meestal treedt na een RF-behandeling **nabehandelingpijn** op die een 2-tal weken kan aanhouden; hiervoor mag u gerust een klassieke pijnstiller innemen (paracetamol, ibuprofen...)

Complicaties

Deze komen **zeer zelden** voor.

1. Lokale infectie
2. Lokale bloeding

Voor meer info raadpleeg:

Dr. S. Segers
Dr. S. Vanherpen
Dr. S. Anssens
Artsen pijnkliniek

E pijnkliniek@azoudenaarde.be

AFSPRAAK: 055/33.63.97

AZO/PIJ/256
V2.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be