

COMPLICATIES

Deze komen **zeer zelden** voor.

1. Postpunctie hoofdpijn

Deze vorm van hoofdpijn is houdingsgebonden: de pijn komt op bij rechtop komen en situeert zich ter hoogte van het achterhoofd en de nek; ze verdwijnt wanneer u zich neerlegt. Deze kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en duizeligheid maar NOOIT met KOORTS.

De behandeling bestaat uit bedrust, voldoende drinken, inname van cafeïnerijke dranken (koffie, cola, redbull) en pijnstillers (paracetamol). Bij blijvende last contacteert u de pijnkliniek.

2. Epidurale bloeding

De epidurale ruimte is rijkelijk doorbloed. Tijdens de prik kan een klein bloedvatje aangeprikt worden waardoor een bloeding kan ontstaan; deze is ongevaarlijk indien u geen bloedverdunners neemt of deze tijdig gestopt heeft.

3. Hersenvliesontsteking

Dit is een infectie van het ruggenmergvocht die optreedt binnen de 24 uur na de prik; u voelt zich ziek, heeft koorts met nekstijfheid:

DRINGENDE ZIEKENHUISOPNAME !

Voor meer info raadpleeg:

Dr. S. Segers

Dr. S. Vanherpen

Artsen pijnkliniek

E: steven.segers@azoudenaarde.be

sophie.vanherpen@azoudenaarde.be

PIJNKLINIEK

DE THERAPEUTISCHE
WORTELBLOCK

ARTSEN

DR.S. SEGERS

DR. S. VANHERPEN

PATIËNTENINFORMATIE

AZO/PII/257
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

DE WORTELBLOCK

De therapeutische wortelblock, ook wel transforaminale epidurale infiltratie genoemd, is een behandeling waarbij de arts via één van de openingen aan de zijkant (neuroforamen) van de wervelkolom een cortisone infiltratie geeft. Door deze openingen treedt de zenuwwortel per segment buiten de wervelkolom.

Procedure

De behandeling gebeurt in buikligging op een onderzoekstafel. Nadat de huid ter hoogte van de prikplaats ontsmet is, wordt de huid aangeprikt met een dunne naald. Onder radioscopische controle wordt de naald verder opgeschoven tot in de opening aan de zijkant van de wervel waar de zenuwwortel de wervelkolom verlaat. De correcte positie van de naald wordt gecontroleerd met een beetje contraststof die via de naald wordt ingespoten.

Effect van deze behandeling treedt na 2 à 3 weken op. Initieel kan de pijn tijdelijk toenemen, normaliter verdwijnt dit na enkele dagen.

De behandeling vergt een opname in het **dagziekenhuis**. Een uur na de behandeling kan u het dagziekenhuis verlaten **onder begeleiding** en **mag u gedurende 24 uur niet deelnemen aan het verkeer**.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Een **zwangerschap** moet steeds vooraf gemeld worden.

Thuismedicatie

1. Bloedverdunnende geneesmiddelen:

Cardioaspirine en asaflow:

Deze moeten niet gestopt worden. Vermeld het gebruik van deze geneesmiddelen aan uw arts.

Ticlid, Plavix, Clopidogrel, Aggrenox:

Deze moeten 10 dagen voor de infiltratie gestopt worden. Er moet geen controle bloedafname gebeuren en geen vervanging gebeuren met onderhuidse prikjes.

Marevan, Marcoumar, Sintrom:

Afhankelijk van het product moeten zij 5 à 10 dagen voor de interventie gestopt worden.

De dag voor de interventie dient **ALTIJD** een bloedafname te gebeuren met bepaling van PTT. (PTT > 70).

Na stopzetting van deze medicatie moet altijd substitutie gebeuren door middel van onderhuidse prikjes (Fraxiparine of Clexane). Dit prikje mag niet gegeven worden op de dag van de behandeling, 12 uur na de behandeling mag terug een onderhuids prikje gegeven worden.

Xarelto, Pradaxa, Eliquis:

Deze medicatie moet 48 uur voor de behandeling gestopt worden. Er moet geen bloedafname gebeuren. Daags na de behandeling mag deze medicatie herstart worden.

2. Antibiotica:

Gebruik van antibiotica en de reden waarom ze genomen moeten worden meldt u aan de arts.

3. Overige medicatie:

De overige thuismedicatie mag door de patiënt verder ingenomen worden.

Allergieën

Indien u een allergie heeft, meldt u dit **ALTIJD VOOR DE BEHANDELING** aan de arts.

Naast medicatie wordt in de pijnkliniek vaak gebruik gemaakt van ontsmettingsstof, contraststof en kleefpleisters; ook allergieën hiervoor meldt u aan de arts.

Koorts of ziekte

Bij een temperatuur > 37.5 °C of bij ziekte wordt de behandeling **NIET UITGEVOERD**.

Gelieve in deze situatie uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te vragen.

Bijwerkingen

Napijn

Deze pijn treedt op na de prik en verdwijnt na enkele dagen; deze kan behandeld worden met paracetamol.

Bijwerkingen door cortisone:

Blozen en zweten, hartkloppingen, kloppende hoofdpijn, opvliegers, onregelde suikerspiegels bij diabetespatiënten, verstoorde menstruatie.