

# DE THORACALE EN LUMBALE FACETINFILTRATIE

PIJNKLINIEK

ARTSEN

Dr. S. Segers  
Dr. S. Vanherpen  
Dr. S. Anssens

- Patiëntinformatie -

AZ OUDENAARDE  
VZW



| [WWW.AZOUDENAARDE.BE](http://WWW.AZOUDENAARDE.BE) |



## De facetinfiltratie

De facetgewrichten zijn de gewrichten tussen onze wervels en kunnen klachten veroorzaken door overbelasting of ontsteking. Bij de thoracale en lumbale facetinfiltratie worden één of meerdere gewrichtjes tussen de thoracale en lumbale wervels geïnfiltreerd met cortisone.

### Procedure

De behandeling gebeurt in buikligging op een onderzoekstafel.

Nadat de huid eerst ontsmet is, wordt met een zeer dunne naald geprikt naar één of meerdere gewrichtjes. De correcte naaldpositie wordt eerst radioscopisch gecontroleerd alvorens de medicatie wordt ingespoten.

Het effect van de medicatie treedt op na 2 à 3 weken.

De procedure gebeurt **ambulant** en vergt geen dagziekenhuisopname. Na de behandeling kan u het ziekenhuis verlaten **onder begeleiding** en mag u **gedurende 12 uur niet deelnemen aan het verkeer**.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Een **zwangerschap** moet steeds vooraf gemeld worden.

# Thuismedicatie

## 1. Bloedverdunnende geneesmiddelen:

Voor iedere soort bloedverdunner is een ander beleid nodig voor en na de behandeling. Contacteer steeds uw huisarts voor de behandeling, zodat uw bloedverdunner tijdig gestopt kan worden.

### **Cardioaspirine en asaflow:**

Deze moeten 5 dagen voor de infiltratie gestopt worden.

### **Ticlid, Plavix, Clopidogrel:**

Deze moeten 7 dagen voor de infiltratie gestopt worden. Er moet geen controlebloedafname gebeuren en geen vervanging met onderhuidse prikjes.

### **Marevan, Marcoumar, Sintrom:**

Deze medicatie moet 7 dagen voor de interventie gestopt worden.

De dag voor de interventie dient ALTIJD een bloedafname te gebeuren met bepaling van PTT en INR. ( PTT > 70, INR<1,3).

Na stopzetting van deze medicatie moet altijd substitutie gebeuren door middel van onderhuidse prikjes (Fraxiparine of Clexane). Dit prikje mag niet gegeven worden op de dag van de behandeling, 12 uur na de behandeling mag terug een onderhuids prikje gegeven worden.

### **Xarelto, Lixiana en Eliquis:**

Deze medicatie moet 3 dagen voor de behandeling gestopt worden. Er moet geen bloedafname gebeuren. Daags na de behandeling mag deze medicatie herstart worden.

**Pradaxa:**

Deze medicatie moet na 3 à 5 dagen gestopt worden, afhankelijk van de nierfunctie.

GFR > 30ML/MIN: 3 dagen

GFR < 30ML/MIN: 5 dagen

**Aggrenox:** 3 dagen.

**Efient:** 9 dagen.

**Brillique:** 7 dagen.

**Fraxiparine, clexane en fragmin:**

Profylactische dosis: 12 uur.

Therapeutische dosis: 24 uur.

Cave nierfunctie.

**Innohep en fraxodi:**

Minimum 24 uur.

**Arixtra:**

Minimum 48 uur.

**2. Antibiotica:**

Gebruik van antibiotica en de reden waarom ze genomen moeten worden, meldt u aan de arts.

**3. Overige medicatie:**

De overige thuismedicatie mag u verder innemen.

## Allergieën

Indien u een allergie heeft, dient u dit **ALTIJD VOOR DE BEHANDELING** aan de arts te melden.

Naast medicatie wordt in de pijnkliniek vaak gebruik gemaakt van ontsmettingsstof, contraststof en kleefpleisters; ook allergieën hiervoor dient u steeds te vermelden.

## Koorts of ziekte

Bij een temperatuur > 37.5 °C of bij ziekte wordt de behandeling **NIET UITGEVOERD**.

Gelieve in deze situatie uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te vragen.

## Bijwerkingen

### Napijn

Deze treedt op na de prik en verdwijnt na enkele dagen. De napijn kan behandeld worden met paracetamol.

### Bijwerkingen door cortisone

Blozen en zweten, hartkloppingen, kloppende hoofdpijn, opvliegers, onregelde suikerspiegels bij diabetespatiënten, verstoorde menstruatie.

# Complicaties

Deze komen zeer zelden voor.

## 1. Postpunctie hoofdpijn

Deze vorm van hoofdpijn is houdingsgebonden: de pijn komt op bij rechtop komen en situeert zich ter hoogte van het achterhoofd en de nek; ze verdwijnt wanneer u zich neerlegt. Deze pijn kan gepaard gaan met misselijkheid, braken en duizeligheid, maar **NOOIT** met **KOORTS**.

De behandeling bestaat uit bedrust, voldoende drinken, inname van cafeïnerijke dranken (koffie, cola, redbull) en pijnstillers (paracetamol). Bij blijvende last contacteert u de pijnkliniek.

## 2. Epidurale bloeding

De epidurale ruimte is rijkelijk doorbloed. Tijdens de prik kan een klein bloedvaatje aangeprikt worden waardoor een bloeding kan ontstaan; deze is ongevaarlijk indien u geen bloedverdunners neemt of deze tijdig gestopt heeft.

## 3. Hersenvliesontsteking

Dit is een infectie van het ruggenmergvocht die optreedt binnen de 24 uur na de prik; u voelt zich ziek, heeft koorts met nekstijfheid:

**DRINGENDE ZIEKENHUISOPNAME !**

**Voor meer info raadpleeg:**

**Dr. S. Segers  
Dr. S. Vanherpen  
Dr. S. Anssens**

**Artsen pijnkliniek**

**E** [pijnkliniek@azoudenaarde.be](mailto:pijnkliniek@azoudenaarde.be)

**AFSPRAAK: 055/33 63 97**

AZO/PIJ/258  
V2.0

**AZ OUDENAARDE**  
VZW



**AZ OUDENAARDE VZW**

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

[info@azoudenaarde.be](mailto:info@azoudenaarde.be)

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)