

Voor meer info raadpleeg:

Dr. B. Casier

Dr. G. Truijen

Dienst urologie

Voor afspraken:

T 055 33.66.38

CIRCUMCISIE BIJ VOLWASSENEN

BESNIJDENIS

- Patiëntinformatie -

AZO/URO/076
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

INLEIDING

Phimosis of vernauwing van de voorhuid kan aanleiding geven tot ontstekingen van de voorhuid of de eikel en moeilijkheden bij het urineren opwekken tot zelfs pijn bij seksuele betrekkingen. De voorhuid dient daarom te worden verwijderd. De operatie die hiervoor wordt uitgevoerd noemt men een circumcisie of besnijdenis.

VOORBEREIDING

Om infectie te voorkomen, wordt verzocht de avond voor de ingreep de beharing van de penis zorgvuldig weg te scheren. Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, zal dit in overleg met uw arts 1 week voor de ingreep stopgezet worden.

DE OPERATIE

De voorhuid wordt geheel verwijderd onder algemene, ruggenprik (rachi-) of lokale verdoving.

Soms zijn er uitgebreide verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel de eerste dagen na de operatie er vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit.

Er wordt een circulair verband aangebracht tot enkele uren na de ingreep om de zwelling tegen te gaan.

NAZORG

Als de verdoving uitgewerkt is, kan het wondje pijnlijk worden. Als pijnstillers kan zo nodig paracetamol (®Dafalgan, ®Perdolan) ingenomen worden.

De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. Dit kan gedurende enige weken plaatselijk lichte irritatie veroorzaken. Vanaf 1 dag postoperatief tot aan de controle afspraak na 1 week wordt de wonde best dagelijks ontsmet met Isobetadine Dermicum. Nadien wordt de wonde gewoon droog gehouden.

Mogelijke complicaties (die evenwel zelden voorkomen) zijn nabloeding, infectie en koorts, waarbij U best de arts (huisarts of uroloog) raadpleegt.

Na 1 à 2 weken is sporten weer mogelijk. Gelieve seksuele betrekking uit te stellen tot de wonde volledig genezen is (na ± 3 weken).

We wensen u van harte een spoedig
herstel!