

HYDROCOELECTOMIE

HEELKUNDIGE BEHANDELING WATERBREUK

- Patiëntinformatie -

AZ OUDENAARDE
VZW



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

Een hydrocoele is een afwijking die in de volksmond “waterbreuk” wordt genoemd.

De zaadballen worden omgeven door vliezen, waartussen zich vocht bevindt. Bij een hydrocoele is de balzak gezwollen door een toename van het vocht rondom de teelbal en bijbal.

Een zwelling door een hydrocoele is meestal klein en voelt zacht aan. De zwelling kan echter oplopen tot zo'n 15 cm in doorsnee en daardoor hinderlijk groot zijn. Soms is er sprake van pijn, met name als er veel spanning op de huid staat. De oorzaak is vaak onbekend. Een ontsteking van de bijbal of trauma kan aanleiding geven tot de zwelling. Bij uitzondering kan een tumor van de bal achter de zwelling schuilgaan. Om de oorzaak van de hydrocoele op te sporen, voert men meestal een echografie uit.

Boven de leeftijd van 65 jaar komt een hydrocoele veel vaker voor dan het gemiddelde, 1,1 per 1000 mannen per jaar.

Onderzoek

Rondom de testis is een gladde symmetrische zwelling voelbaar. De zwelling kan strak gespannen staan, waardoor de testis zelf niet voelbaar is.

Behandeling

Een hydrocoele heeft meestal geen behandeling. Het is niet kwaadaardig en wordt dit ook niet.

Punctie en afzuigen van vocht geven vaak slechts tijdelijk verlichting en kunnen een haematoom of infectie veroorzaken. Deze technieken worden dan ook niet meer toegepast.

Bij klachten of vanwege cosmetische bezwaren kan een operatieve behandeling gepland worden via dagopname. Preoperatieve onderzoeken worden op voorhand gepland en uitgevoerd.

De ingreep gebeurt via een kleine snede in de balzak. Meestal wordt er een mini-drain geplaatst om het eventueel aangemaakte wondvocht te verwijderen.

De dag van de operatie

- U komt 's ochtends nuchter binnen.
- Graag een goed strak zittende onderbroek dragen.
- De ingreep gebeurt onder volledige verdoving of met een ruggenprik.
- Na een kort verblijf in het operatiekwartier keert u naar het dagziekenhuis terug.
- De mini-drain en het infuus in de arm worden na een paar uur verwijderd.
- Op de wonde wordt ijs gelegd om zwelling te voorkomen.
- 's Avonds kan u lichte voeding gebruiken.
- U kunt meestal 's middags het ziekenhuis verlaten.
- U krijgt een afspraak voor een controle bij uw arts binnen enkele weken.

Nazorg

Wanneer de verdoving uitgewerkt is, kan het wondje pijnlijk worden. Als pijnstiller kan zo nodig Paracetamol onder de vorm van Dafalgan[®] of Perdolan[®]. Indien de pijn hiermee niet wegtrekt, kan best Diclofenac (Voltaren[®]), Ibuprofene (Brufen[®]) of Nurofen[®] worden ingenomen.

- Het is aangewezen om de eerste dag thuis ijs op de wonde aan te brengen.
- De wonde moet dagelijks ontsmet worden (bv. met compres of met een wattenstaafje) met een niet-alcoholisch ontsmettingsmiddel : Iso-Betadine[®], HAC[®] of Hibidil[®].
- Indien u hiervoor beroep wenst te doen op een verpleegkundige, dan kan u de nodige voorschriften meekrijgen of wordt dit geregeld via uw huisarts.
- De wondjes hoeven niet afgedekt te worden met een verband.
- De draadjes zullen spontaan verdwijnen.
- Douchen mag vanaf de tweede dag na de operatie. In bad gaan is af te raden.

Bij mogelijke complicaties zoals nabloeding, infectie en koorts, raadpleegt u best uw arts. Deze complicaties komen echter zelden voor. De balzak kan wel nog enkele weken opgezet zijn.

Na 1 à 2 weken is de wonde volledig geheeld en is sporten (ook zwemmen) weer mogelijk.

We wensen u van harte een spoedig herstel !

Voor meer info raadpleeg:

Dr. Casier Bram

Dr. Truijen Geert

Dienst Urologie

Voor afspraken:

T 055 33.66.38

AZO/URO/168
V1.0

AZ OUDENAARDE
VZW



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be