

Voor meer info raadpleeg:

**Dr. C. Beyls**  
**Dr. K. Lecluyse**  
**Dr. M. Remery**  
**Dr. Ph. Vanbiervliet**

Dienst Gastro-enterologie

055 33 67 61

✉ [inwendige.consultaties@azoudenaarde.be](mailto:inwendige.consultaties@azoudenaarde.be)

Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde  
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95  
[info@azoudenaarde.be](mailto:info@azoudenaarde.be)

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



AZO/GAS/170  
Laatst aangepast op 25/09/2019  
V.U.: AZ Oudenaarde

Gastro-  
enterologie



## LINKER COLOSCOPIE

## Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE  
VZW




[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)  
Volg ons op



## WAT IS EEN LINKER COLOSCOPIE?

Een linker coloscopie is een endoscopisch onderzoek van het colon waarbij de arts met een camera in het dalende gedeelte van de dikke darm gaat. Zo kan hij het slijmvlies van de darm in detail onderzoeken. De techniek laat toe om tijdens dit onderzoek biopsies (stukjes weefsel) te nemen. Deze worden in het laboratorium onder de microscoop onderzocht.

Het endoscopisch onderzoek duurt meestal een 15-tal minuten.



## VOORBEREIDING

Om het onderzoek vlot te laten verlopen, moet het dalende gedeelte van de dikke darm volledig leeg zijn. Hiervoor krijg je een lavement toegediend. Al naargelang het voorschrift van de arts zal dit gaan over een klein of een groot lavement. Je hoeft bij dit onderzoek niet nuchter te zijn.

## WAT ZIJN DE NEVENWERKINGEN?

Om tijdens het onderzoek de darm goed in beeld te brengen, moet er lucht in de darm geblazen worden. Dit kan enig ongemak veroorzaken tijdens het onderzoek, maar de procedure kan zonder verdoving uitgevoerd worden.

Bij het nemen van een biopsie wordt het slijmvlies beschadigd, waardoor een klein bloedingsrisico bestaat. Om dit risico in te perken, is het noodzakelijk dat je melding maakt van het gebruik van bloedverdunnende medicatie, zodat deze tijdig kan onderbroken worden.

## NA HET ONDERZOEK

Door het blazen van lucht in de darm is het mogelijk dat je tot 30 min. na het onderzoek een gevoelige onderbuik heeft. Dit gaat meestal over als je wat wind hebt kunnen laten.

Ben je via het dagziekenhuis opgenomen, dan kan je het ziekenhuis verlaten na de bespreking van de resultaten met de arts.