

VERLOOP VAN DE DAG

Het tijdstip van opname op het dagziekenhuis wordt door uw arts meegedeeld, meestal is dit rond 8u30. Voor dit onderzoek is het toegestaan een klein ontbijt te nuttigen. Je kan ook je gewone medicatie innemen, *met uitzondering van bloedverduunners*.

Je moet je hiervoor inschrijven in het dagziekenhuis.

De punctie vindt meestal plaats in de vroege ochtend.

Je kan rond de middag het ziekenhuis verlaten, maar wij raden aan om niet zelf de wagen te besturen. Het is ook aan te bevelen om het de rest van de dag rustig aan te doen, om het bloedingsrisico minimaal te houden.

Het resultaat van de punctie volgt na ongeveer 1 week. De arts zal een vervolgspraak regelen op het ogenblik van uw ontslag.

Voor meer info raadpleeg:

Dr. C. Beyls
Dr. K. Lecluyse
Dr. M. Remery
Dr. P. Vanbiervliet

Dienst gastro-enterologie

055 33 67 61

✉ inwendige.consultaties@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95
info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/GAS/275
Laatst aangepast op 27/09/2019
V.U.: AZ Oudenaarde

Gastro-
enterologie



LEVERPUNCTIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be
Volg ons op



DOEL VAN HET ONDERZOEK - INDICATIES

Bij vermoeden van leverstoornissen is het mogelijk dat de bloedanalyses niet tot een diagnose leiden. In andere gevallen is een diagnose al gesteld, maar is het noodzakelijk om de ernst van de leverschade in detail te meten. In nog andere gevallen kan het zijn dat bij er een letsel in de lever werd vastgesteld.

Uw arts heeft je in een van deze gevallen een leverpunctie voorgesteld, met als doel het bekomen van een weefselstaal dat onder de microscoop kan geanalyseerd worden.


HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?

Met een zeer fijne holle naald zuigt de arts een klein cilindertje op uit de lever. De plaats van de punctie wordt bepaald aan de hand van een echografisch onderzoek, voorafgaand aan de punctie. Hoewel de lever zelf ongevoelig is voor pijnprikkels, moet het traject dat de naald volgt doorheen de huid en tussen de ribben verdoofd worden. Behalve bij de injectie van de lokale verdoving zal je geen pijn voelen, de punctie zelf is dus volledig pijnloos.

Het onderzoek vindt plaats op de consultatie en duurt ongeveer 10 minuten.

NAZORG

Het is belangrijk om na de punctie gedurende enkele uren op de punctieplaats te gaan liggen, zodat de plaats van de inwendige wonde wordt dichtgeduwd door het lichaamsgewicht. Tijdens deze periode word je geobserveerd op het dagziekenhuis.



Het is mogelijk dat de pleister die de punctieplaats bedekt licht bloederig wordt, maar dat is niet abnormaal. Je kan gedurende enkele uren een lichte pijn ondervinden ter hoogte van de punctieplaats of in de rechter schouder, maar ook dat is volstrekt normaal en helemaal geen reden tot ongerustheid.

COMPLICATIES

Bloeding

De belangrijkste en minst zeldzame complicatie is een bloeding. Symptomen hiervan kunnen zijn: hevige pijn in de leverstreek of de rechter schouder, of draaierigheid als gevolg van een lage bloeddruk.

Het gaat om een zeer zeldzame verwikkeling, waarvan het risico nog verder beperkt wordt door voorafgaandelijke controle van de stollingstesten, en - zo van toepassing - het tijdig onderbreken van bloedverduunners. Belangrijk is om zich te realiseren dat ook ontstekingsremmers de stolling kunnen beïnvloeden (Voltaren, Aspirine enz...), hoewel dit niet altijd een beletsel vormt voor de procedure. Bij twijfel over de veiligheid van medicatie kan je overleggen met uw arts.

Wanneer de bloeding niet spontaan stopt, kan een chirurgische ingreep aangewezen zijn, maar dit is zeer ongewoon.

Andere

Heel uitzonderlijk is een overgevoeligheidsreactie op de lokale verdoving.

Bij aanprikken van een galweg kan een gallek ontstaan.

De kans op dergelijke complicaties is echter extreem klein.