

AFSPRAKEN:

Lactose ademtest op

..... omu

Glucose ademtest op

..... omu

Fructose ademtest op

..... omu

Voor meer info raadpleeg:

Dr. C. Beyls
Dr. K. Lecluyse
Dr. M. Remery
Dr. P. Vanbiervliet

Dienst Gastro-enterologie

055 33 67 61

✉ inwendige.consultaties@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/GAS/299

Laatst aangepast op 04/01/2021

V.U.: AZ Oudenaarde

Gastro-
enterologie



ADEMTEST (LACTOSE, GLUCOSE, FRUCTOSE)



Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op




PRINCIPE VAN DE TEST

Waterstofgas (H_2) wordt door darmbacteriën gemaakt tijdens de afbraak van de koolhydraten (suikers). Dit waterstofgas wordt opgenomen in het bloed, passeert de longen en wordt uitgeademd. Waterstofgas is meetbaar door een zogenaamd

H_2 ademtestapparaat.

Met deze meting kan men aantonen of er een intolerantie bestaat voor lactose (lactosetest) en of er een bacteriële overgroei is (glucosetest).



VOORBEREIDING

Het is aan te bevelen de avond voor het onderzoek een licht verteerbare maaltijd te gebruiken, zoals wit brood, witte rijst, kip, bloemkool, appelmoes, eieren, visfilet, magere vleeswaren. Je gebruikt best geen melk of melkproducten, geen vers fruit en geen vruchtensap met vruchtvlees.

De ochtend van het onderzoek moet je nuchter zijn.

D.w.z. dat je de avond voorafgaand aan de dag van de test vanaf 19u niets meer mag eten. Vanaf 22u mag je niets meer drinken. Bovendien is roken vanaf 22u ook niet meer toegestaan.

Sommige **medicijnen** hebben invloed op het resultaat van de test. Als je antibiotica gebruikt, dan moet je dit aan de behandelende arts melden. Indien je medicijnen gebruikt die niet zonder risico gestopt kunnen worden, zoals medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag je deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen.

Tanden moeten goed gepoetst worden voor de test.

DE UITVOERING VAN DE TEST

Gelieve je eerst in te schrijven via de kiosk in het hoofdgebouw en je daarna aan te melden aan het secretariaat inwendige ziekten.

Het secretariaat verwittigt de verpleegkundige dat je je hebt aangemeld en verwijst je verder door naar de scopiewachtzaal in blok D.

Om de uitgeademde lucht op te vangen, blaas je in een meettoestel. Na het eerste ademmonster moet je éénmaal een suikeroplossing drinken. Vervolgens wordt er gedurende ten hoogste 3 uur met regelmaat een ademmonster getest.

