

CONTROLE

Tel. consultatie AZ Oudenaarde:

055 33 66 38

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

☎ 055 33 67 00

✉ verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Dr. Dallequin – Dr. Ghesquiere – Dr. Claeys –

Dr. Shiri - Dr. Dalewyn

op/...../..... om u

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/GYN/235

Laatst aangepast op 16/03/2021

V.U.: AZ Oudenaarde

Gynaecologie
Verloskunde



INFORMATIE- BROCHURE BIJ ONTSLAG

NA CONISATIE VAN DE
BAARMOEDERHALS

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mevrouw,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel na een conisatie.

Een conisatie is een kleine operatie waarbij de gynaecoloog een stukje weefsel van de baarmoedermond wegneemt.

Deze ingreep gebeurt meestal wanneer er sprake is van een verstoorde opbouw van weefselcellen (= dysplasie, veroorzaakt door het HPV-virus: humaan papillomavirus; wordt overgedragen tijdens seksuele betrekkingen).

Om een verdere woekering van deze cellen te voorkomen, neemt de gynaecoloog het zieke slijmvlies weg.

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Ze vindt plaats in het dagziekenhuis. Je hoeft dus niet te overnachten in het ziekenhuis.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Het is mogelijk dat de arts jou een voorschrift opmaakt om gedurende 7 dagen Dalacin® Crème vaginaal in te brengen bij het slapengaan.

Het is normaal om gedurende enkele dagen tot een paar weken wat waterig of bloederig vaginaal verlies te ondervinden.

In deze periode vermijd je best zware inspanningen en seksuele betrekkingen: deze kunnen immers een hevigere bloeding uitlokken.

Wordt het vaginaal verlies etterig of slecht ruikend, dan moet je de behandelende arts contacteren.

Een controleraadpleging na 4 weken is aangewezen.

MEDICATIE

Paracetamol 1 g

Indicatie: bij pijn

Frequentie: zo nodig 4 comprimés per dag (om de 6 u).

ETEN EN DRINKEN

Volgens de richtlijnen van de anesthesist:

- mag je iets drinken vanaf:

.....u

- mag je een licht verteerbare maaltijd eten vanaf:

.....u

Je mag geen alcohol nuttigen tot de dag na de ingreep.

COMPLICATIES

Neem contact op met de gynaecoloog indien je last krijgt van:

- toenemende buikpijn
- koorts
- hevig en/of slecht ruikend bloedverlies
- etterig vaginaal verlies