

## MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle medicijnen kan ook Privigen® bijwerkingen veroorzaken, hoewel deze niet bij elke patiënt voorkomen.

Deze kunnen zichtbaar worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis of op een later moment.

- koorts
- rillingen
- hoofdpijn
- braken
- spier- (lage rugpijn) en gewrichtspijn
- lage bloeddruk
- griepig gevoel

We raden je aan om tijdens en na de behandeling goed te drinken.

Je kan tijdens of na de behandeling meer vermoeid zijn dan normaal. Dit verschilt van persoon tot persoon en kan door de ziekte of andere factoren veroorzaakt worden.

## LAAT HET ONS WETEN

Indien je bijkomende vragen zou hebben, aarzel dan niet om jouw arts of verpleegkundigen te contacteren. Dit kan telefonisch of via mail, terug te vinden op onze website.

Voor meer info raadpleeg:  
Dagziekenhuis Inwendige Ziekten

☎ 055 33 69 00

✉ [verpleegpost.d2@azoudenaarde.be](mailto:verpleegpost.d2@azoudenaarde.be)

Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde  
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95  
[info@azoudenaarde.be](mailto:info@azoudenaarde.be)

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



AZO/MED/428  
Laatst aangepast op 22/06/2020  
V.U.: AZ Oudenaarde



PRIVIGEN®

## Informatie voor patiënten



[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)  
Volg ons op



## WAT IS PRIVIGEN®?

Privigen® is een gammaglobuline. Dat is een deel van een eiwit dat uit menselijk plasma wordt gehaald.

## WANNEER WORDT PRIVIGEN® TOEGEDIEND?

- Bij bepaalde auto-immuunziekten zoals:
  - Guillain Barré
  - MS
  - Multifocale motorisch neuropathie
  - Chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie.
- Bij bepaalde hematologische of pneumologische aandoeningen.
- Na bepaalde behandelingen waarbij de B-lymfocyten minder werken (zoals na toediening van Mabthera® of na stamceltransplantatie).

## HOE WORDT PRIVIGEN® TOEGEDIEND?

Privigen® wordt via een infuus toegediend.

De looptijd van het infuus is afhankelijk van de hoeveelheid toe te dienen medicatie, maar kan oplopen tot 3 uur.

Tijdens de behandeling worden parameters (pols, bloeddruk, temperatuur en zuurstofsaturatie) opgevolgd. Heb je last van een onverwachte bijwerking of heb je vragen? Breng de verpleegkundige op de hoogte.

## DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE BEHANDELING

Stap 1: De verpleegkundige brengt jou naar de kamer en overloopt jouw dossier samen met jou.

Stap 2: De verpleegkundige meet vitale parameters zoals temperatuur, bloeddruk en gewicht.

Stap 3: De verpleegkundige prikt bloed en legt het infuus aan.

Stap 4: Start van de behandeling.

Stap 5: Verwijderen van het infuus.

Stap 6: Controle van de parameters en ontslag.

## WAAR MOET JE ZIJN VOOR DEZE BEHANDELING?

De behandeling gebeurt in het dagziekenhuis Inwendige Ziekten. Het dagziekenhuis bevindt zich in het witte gebouw (Blok D). Je meldt je aan het onthaal van het dagziekenhuis aan voor je inschrijving. Daarna neem je de lift naar de 2<sup>de</sup> verdieping en meld je je aan bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Het dagziekenhuis is open op weekdays van 7u30 tot 19u30.

## MOET JE NUCHTER ZIJN?

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij de arts dit uitdrukkelijk gevraagd heeft.