

Voor meer info raadpleeg:  
Kinderafdeling/Neonatologie

☎ 055 33 61 49 of 055 33 61 97

✉ verpleegpost.b1@azoudenaarde.be

Neonatologie



Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE  
VZW



AZO/NEO/230  
09/10/2019  
V.U. AZ Oudenaarde

## MIJN KIND HEEFT MRSA, WAT NU?

### Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE  
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Beste ouder,

De kinderarts of verpleegkundige meldde je dat je kind besmet of gekoloniseerd is met MRSA.

Er werd een fluo gevarendriehoek op de kamerdeur of op de couveuse aangebracht.

## WAT BETEKENT DIT?

MRSA staat voor **M**ethicilline **R**esistente **S**taphylococcus **A**ureus. Heel wat mensen zijn drager van de Staphylococcus aureus-bacterie zonder dat ze het weten of ziekteverschijnselen vertonen. De bacterie kan teruggevonden worden op de huid, in de neus, keel, enz. Bij personen met een verzwakte immuniteit kunnen er wel ziekteverschijnselen optreden.

Hier spreekt men over de methicilline-resistente bacterie, wat wil zeggen dat er een resistentie is tegen één of meerdere antibiotica. Deze antibiotica kunnen dan niet gebruikt worden als behandeling.

**Kolonisatie:** de kiemen zijn aanwezig zonder symptomen van infectie.

**Besmetting of infectie:** optreden van symptomen zoals: koorts, algemene malaise, wondinfectie, luchtweginfectie,...

Een besmetting vraagt behandeling.

## HOE KRIJG JE MRSA?

Een heel kleine hoeveelheid van de bacterie is voldoende om een kolonisatie of een besmetting te veroorzaken.

Hoe wordt MRSA overgedragen?

- Door slechte handhygiëne na direct contact met je gekoloniseerd of besmet kind.
- Na contact met besmette voorwerpen uit de directe omgeving van je kind.
- Een MRSA-pneumonie wordt overgedragen door druppelcontact: de bacterie bevindt zich in kleine druppeltjes die bij hoesten of niezen in de lucht komen.
- Verspreiding via gekoloniseerde ziekenhuismedewerkers of ouders
- Ook een blaas(sonde), wonde of katheter-insteekplaats zijn plaatsen waar een besmetting kan ontstaan.

## BEHANDELING

Het is niet altijd nodig om antibiotica toe te dienen als iemand drager is van MRSA. De antibiotica die nog werkzaam is tegen MRSA mag enkel in echte noodzaak gebruikt worden, om te vermijden dat de bacterie ook daartegen resistent zou worden. Het belangrijkste is om overdracht naar andere personen te vermijden.

## ISOLATIE

Je kind zal in een aparte kamer of zone worden verpleegd zolang het besmet is. Wanneer je kind verzorgd wordt, neemt het personeel de nodige maatregelen om overdracht naar andere patiënten te voorkomen.

## PREVENTIEVE MAATREGELEN

De volgende eenvoudige maar doeltreffende maatregelen ter preventie van overdracht naar andere personen worden van jou verlangd op neonatologie:

- Draag bij contact met je kind een beschermende schort, masker en handschoenen.
- Ontsmet steeds de handen bij het verlaten van de kamer (handpompje in de gang of in de nabijheid van de couveuse), ook al was er geen patiëntencontact.

Bij opname op pediatrie:

- Blijf met je kind op de kamer (geef geen speelgoed van jouw kind aan andere kinderen) en vermijd contact met andere kinderen.

Algemene maatregelen:

- Kleren en knuffels was je op minstens 40°C, gebruik hiervoor voldoende detergent en een volledig wasprogramma. Droog bij voorkeur in de droogkast. De eerstvolgende was na mogelijk besmette kledij is best een kookwas.