

Voor meer info raadpleeg:

Dr. B. Casier

Dr. G. Truijen

Dienst urologie

Voor afspraken:

055 33.66.38

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/URO/076

Laatst gewijzigd op 22/12/2020

V.U. AZ Oudenaarde

Urologie



CIRCUMCISIE BIJ VOLWASSENEN

BESNIJDENIS

- Patiëntinformatie -

Informatie voor patiënten



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



INLEIDING

Phimosis of vernauwing van de voorhuid kan aanleiding geven tot ontstekingen van de voorhuid of de eikel en moeilijkheden bij het urineren opwekken tot zelfs pijn bij seksuele betrekkingen. De voorhuid dient daarom te worden verwijderd. De operatie die hiervoor wordt uitgevoerd, wordt een circumcisie of besnijdenis genoemd.

VOORBEREIDING

Om infectie te voorkomen, vragen we je om de avond voor de ingreep de beharing van de penis zorgvuldig weg te scheren. Indien je bloedverdunnende middelen gebruikt, moet je deze in overleg met de arts 1 week voor de ingreep stopzetten.

DE OPERATIE

De voorhuid wordt geheel verwijderd onder algemene, ruggenprik (rachi-) of lokale verdoving.

Soms zijn er uitgebreide verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel de eerste dagen na de operatie er vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit.

Er wordt een circulair verband aangebracht tot enkele uren na de ingreep om de zwelling tegen te gaan.

NAZORG

Als de verdoving uitgewerkt is, kan het wondje pijnlijk worden. Als pijnstillers kan zo nodig paracetamol (®Dafalgan, ®Perdolan) ingenomen worden.

De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. Dit kan gedurende enige weken plaatselijk lichte irritatie veroorzaken. Vanaf 1 dag postoperatief tot aan de controle afspraak na 1 week wordt de wonde best dagelijks ontsmet met Isobetadine Dermicum. Nadien wordt de wonde gewoon droog gehouden.

Mogelijke complicaties (die evenwel zelden voorkomen) zijn nabloeding, infectie en koorts, waarbij je best de arts (huisarts of uroloog) raadpleegt.

Na 1 à 2 weken is sporten weer mogelijk. Gelieve seksuele betrekking uit te stellen tot de wonde volledig genezen is (na ± 3 weken).

**We wensen je van harte
een spoedig herstel!**