

Voor meer info raadpleeg:

Dr. B. Casier

Dr. G. Truijen

Dienst urologie

Voor afspraken:

☎ 055 33.66.38

Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



AZO/URO/077

Laatst gewijzigd op 24/12/2020

V.U. AZ Oudenaarde

Urologie



## CIRCUMCISIE BIJ KINDEREN

BESNIJDENIS

- Patiëntinformatie -

## Informatie voor patiënten



[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)

Volg ons op



## INLEIDING

Phimosis of vernauwing van de voorhuid kan aanleiding geven tot ontstekingen van de voorhuid of de eikel en moeilijkheden bij het urineren opwekken. De voorhuid dient daarom te worden verwijderd. De operatie die hiervoor wordt uitgevoerd, wordt een circumcisie of besnijdenis genoemd. Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor. Ook zijn er ouders die hun zoon laten besnijden omdat ze dit hygiënischer vinden.

## DE OPERATIE

De voorhuid wordt geheel verwijderd onder algemene verdoving. Soms zijn er uitgebreide verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er vaak rood, gezwollen en geïrriteerd uit op de eerste dagen na de operatie. De geplaatste hechtingen zijn oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.

Er wordt een licht drukkend verband aangebracht, bestaande uit vetverband, compressen en een rekverband tot enkele uren na de ingreep om de zwelling tegen te gaan.

## NAZORG

Als de verdoving uitgewerkt is, kan het wondje pijnlijk worden. Als pijnstillers kan zo nodig paracetamol onder de vorm van Dafalgan®, Perdolan® of siroop (Junifen®, Nurofen®) genomen worden.

De eikel is en blijft na de operatie onbedekt. Dit kan gedurende enige weken plaatselijk lichte irritatie veroorzaken. Na de operatie tot aan de controleafspraak na 1 week wordt de wonde best dagelijks ontsmet met Isobetadine Dermicum. Nadien wordt de wonde gewoon drooggehouden.

Mogelijke complicaties (die evenwel zelden voorkomen) zijn nabloeding, infectie en koorts, waarbij je best de arts (huisarts of uroloog) raadpleegt.

Na 1 à 2 weken is de wonde volledig geheeld en is sporten (ook zwemmen) weer mogelijk.

**We wensen je zontje  
van harte een spoedig herstel!**