

CONTROLE

Tel. secretariaat urologie:

055/ 33.66.38

Dr. G. TRUIJEN

Dr. B. CASIER

Verwacht jou op

...../...../.....

Om uur.

Indien je nog vragen hebt of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het dagziekenhuis heelkunde of de huisarts.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

055 33 77 00

✉ verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/URO/265

Laatst aangepast op 23/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Urologie



INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

URETEROSCOPIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

Ureterscopie betekent 'kijken in de ureter', en soms verder tot in de nier, afhankelijk van de positie van de steen of poliep in de urinewegen.

De ureter of urineleider is de buis tussen het nierbekken en de urineblaas. Deze buis leidt urine van de nier naar de blaas. Tijdens de ingreep brengt de uroloog een camera (de ureterscoop) via de plasbuis in de urineleider. Hiermee kan tot in het nierbekken gekeken worden. Vervolgens worden eventuele nierstenen verwijderd of vergruisd of poliepen weggenomen.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Eten en drinken

Je mag eten en drinken naar jouw wens. Matig alcoholgebruik.

Drink voldoende water: 1.5-2 L per dag.

Medicatie

Paracetamol 1 g (Dafalgan[®] - Perdolan[®])

Indicatie: bij pijn

Frequentie: maximaal 4 x per dag

Diclofenac (Voltaren[®]) of Ibuprofen (Brufen[®])

Indicatie: bij pijn, indien paracetamol 1 g niet volstaat.

Frequentie: maximaal 2 x per dag

Deze medicatie is op voorschrift van de arts.

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN

In de urine kan de eerste dagen bloed aanwezig zijn. Dit is normaal en verdwijnt meestal na enkele dagen. Voldoende drinken is hierbij aan te raden.

Het kan zijn dat je nog wat gruis of steentjes uitplast. Dit kan pijnlijk zijn.

Soms kan je hevige pijn in de zij of in de rug krijgen (koliekpijn) na de URS. Dit is meestal binnen enkele dagen verdwenen. Je mag hiervoor de pijnstillers innemen die de arts jou heeft voorgeschreven.

Als je koorts > 38.5°C krijgt of hevige pijn die niet minder wordt als je pijnstillers gebruikt, neem dan contact op met het ziekenhuis of de behandelende uroloog.

Het kan zijn dat er na de procedure een JJ-stent (buisje tussen de nier en de blaas) wordt achtergelaten. Deze stent wordt na 1-2 weken op de raadpleging verwijderd. De aanwezigheid van een JJ-stent kan klachten geven van toegenomen plasfrequentie en een drukkend gevoel in de nier tijdens het plassen.

Wij wensen jou een spoedig herstel!