

CONTROLE

Tel. secretariaat urologie:

055/33.66.38

Dr. G. TRUIJEN

Dr. B. CASIER

Verwacht jou op

...../...../.....

Om uur.

Indien je nog vragen hebt of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het dagziekenhuis heelkunde of de huisarts.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

☎ 055 33 77 00

✉ verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/URO/266

Laatst aangepast op 23/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Urologie



INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

HYDROCOELE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte mijnheer,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

Een hydrocoele is een afwijking die in de volksmond “waterbreuk” wordt genoemd. De zaadballen worden omgeven door vliezen, waartussen zich wat vocht bevindt. Bij een hydrocoele is de balzak gezwollen door een toename van dat vocht rondom de teelbal en bijbal.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Het is aanbevolen om bij thuiskomst zo veel mogelijk rust te houden.

Om zwelling rond de operatiestreek te voorkomen, breng je een koudebron aan. Dit kan een koelelement zijn uit een frigobox, ijsblokjes in een plastic zak of een coldpack. Breng nooit onverpakt en rechtstreeks een koudebron aan op de blote huid!

Gebruik een strakke onderbroek of zwembroek gedurende de eerste 48 u. Dit geeft extra steun, werkt pijnverlichtend en houdt het verband ter plaatse.

ETEN EN DRINKEN

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving of via een ruggenprik. De anesthesist beslist wanneer je mag eten en drinken.

Drinken:uur

Eten: uur

MEDICATIE

Paracetamol 1 g (Dafalgan® - Perdolan®)

Indicatie: bij pijn

Frequentie: maximaal 4 x per dag

Diclofenac (Voltaren®) of Ibuprofen (Brufen®)

Indicatie: bij pijn, indien paracetamol 1 g niet volstaat.

Frequentie: maximaal 2 x per dag

Deze medicatie is op voorschrift van de arts.

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN

Vaak is er na de ingreep een zwelling rondom de teelbal. Deze verdwijnt geleidelijk uit zichzelf na 6-8 weken.

Andere complicaties die zeer zelden voorkomen:

- Nabloeding
- Wondinfectie

Indien je een abnormale zwelling of hardheid ter hoogte van de wondjes ondervindt, neem dan contact op met de uroloog.

WONDVERZORGING

De wonde moet dagelijks ontsmet worden met een ontsmettingsmiddel (Iso-betadine®, HAC®, Hibidil®).

Indien je hiervoor een beroep wenst te doen op een thuisverpleegkundige, dan krijg je hiervoor een voorschrift voorgeschreven door de arts.

De wondjes hoeven niet afgedekt te worden met een verband.

Na 2 dagen mag je weer douchen. Een bad nemen wordt afgeraden.

Na 1 à 2 weken is de wonde volledig genezen, dan mag je baden en is sporten (inclusief zwemmen en seksuele betrekkingen) weer mogelijk.

De Steristrips mogen na 1 week verwijderd worden. Mochten ze eerder vanzelf afvallen, dan is dit geen probleem.

De draadjes zullen spontaan verdwijnen.

Wij wensen jou een spoedig herstel!