

CONTROLE

Tel. secretariaat urologie:

055/33.66.38.

Dr. G. TRUIJEN

Dr. B. CASIER

Verwacht jou op

...../...../.....

Om uur.

Indien je nog vragen hebt of indien zich problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de behandelende arts, de verpleegkundigen van het dagziekenhuis heelkunde of de huisarts.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Heelkunde

☎ 055 33 77 00

✉ verpleegpost.d0@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/URO/267

Laatst aangepast op 23/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Urologie



INFORMATIEBROCHURE BIJ ONTSLAG

PLASBUISOPERATIE: SACHSE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Geachte,

Graag geven wij jou enkele tips en raadgevingen mee die bijdragen tot een spoedig herstel.

Een plasbuisoperatie is noodzakelijk omdat onderzoek door de uroloog heeft uitgewezen dat er een vernauwing aanwezig is in de plasbuis (= urethra).

De plasbuis

Een vernauwing van de plasbuis (urethrastrictuur) kan verschillende oorzaken hebben:

- Anatomische aanleg (bijvoorbeeld kleppen in de plasbuis, aangeboren strictuur van plasbuis);
- Plaatselijke beschadiging door ongeval (bijvoorbeeld een val op de fietsstang);
- Een ontsteking van de plasbuis;
- Na het inbrengen van een sonde (slangetje via de plasbuis naar de blaas om urine af te laten lopen);
- Na een eerdere urologische ingreep via de plasbuis.

Door bovengenoemde oorzaken kan er littekenweefsel in de plasbuis zijn ontstaan, waardoor deze is vernauwd.

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

- Minstens 2 liter water drinken per dag
- Op tijd gaan plassen
- Geen zware arbeid verrichten
- Niet fietsen
- Alcohol alleen in beperkte mate gebruiken
- De eerste 2 weken na de ingreep geen geslachtsgemeenschap.

MEDICATIE

Paracetamol 1 g (Dafalgan[®] - Perdolan[®])

Indicatie: bij pijn

Frequentie: maximaal 4 x per dag

Diclofenac (Voltaren[®]) of Ibuprofen (Brufen[®])

Indicatie: bij pijn, indien paracetamol 1 g niet volstaat.

Frequentie: maximaal 2 x per dag

Deze medicatie is op voorschrift van de arts.

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN

- Branderig gevoel bij het plassen
- Bloedverlies bij het plassen

NAZORG

Het is mogelijk dat je naar huis gaat met een blaassonde. Deze sonde is voorzien van een speciaal stopje dat je moet openen om de urine uit de blaas te laten stromen als je plasdrang hebt.

Deze sonde wordt verwijderd via de huisarts of de specialist 24 uur na de ingreep.

Wij wensen jou een spoedig herstel!