

datum :

inspuiting :

beelden :

E-mail: nucl2@azoudenaarde.be

AFSPRAKEN OP 055/33.60.41

07.30-17.00 (ma-do); (vr enkel telefonisch)

NAAM PATIENT OF VIGNET

**NUCLEAIRE GENEESKUNDE &
BOTDENSITOMETRIE (dr. Filip Gemmel)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE**

**AANVRAGEND GENEESHEER/ DATUM
(RIZIVNUMMER / HANDTEKENING)**

KLINISCHE GEGEVENS

Kopie van verslag aan Dr.

Onderzoeken

BEWEGINGSSTELSEL

- 0 botscan (degeneratie/inflammatie/infectie/
stressfractuur/facetlijden/prothese complicatie)
 - 0 2 of 3-fasen scan van.....
 - 0 SPECT/(lokalisatie) CT van.....
- 0 leukocytenscan dmv monoclonale antilichamen
- 0 botdensitometrie (DEXA/VFA)

ENDOCRINOLOGIE

- 0 schildklierscan met up-take (struma/noduli/thyroiditis)
- 0 bijschildklierscan (opsporen adenoom)

PNEUMOLOGIE

- 0 perfusie en/of ventilatiescan (vermoeden van longembolie
bij contrastallergie of nierinsufficiëntie)
- 0 kwantificatie : preoperatief
- 0 CTEPH : uitsluiten van chronische LE

CARDIOLOGIE

- 0 ventriculografie /MUGA (LVEF in rust)
- 0 myocardperfusie (**NUCHTER**)
 - 0 cyclo-ergometrie (max belasting)
 - 0 farmacologisch (submax belasting)
 - 0 combinatie

LYMFESCAN

- 0 onderste ledematen
- 0 bovenste ledematen

NEUROLOGIE

- 0 hersenperfusie SPECT
- 0 liquorscan (lekkage)
- 0 DaT-scan (parkinsonisme)

GASTRO-ENTERO-HEPATOLOGIE

- 0 speekselklierscintigrafie (vit C)
- 0 maaglediging (**NUCHTER**)
- 0 reflux of melkscan (**NUCHTER**)
- 0 divertikel van Meckel (**NUCHTER**)
- 0 gastro-intestinale bloeding

UROLOGIE-NEFROLOGIE

- 0 DMSA (nierscan)
- 0 renogram met MAG3
 - 0 baseline
 - 0 furosemide

ONCOLOGIE

- 0 botscan
- 0 sentinelprocedure
 - 0 borstcarcinoom
 - 0 melanoom
- 0 octreotidescan (neuro-endocriene tumor)

PET/CT i.s.m. UZ Gent

- 0 FDG PET/CT
- 0 PSMA PET/CT

THERAPIE

- 0 Iodium-131 capsule (**NUCHTER**)
- 0 Samarium-153 (botM+ van prostaatca)
- 0 Xofigo of Radium-223 (botM+ van prostaatca)
- 0 Aclasta infuus via dagkliniek (heup#)
- 0 Forsteo (ernstige osteoporose bij man + vr)
- 0 Evenity (ernstige osteoporose bij vr)

Botscan

Niet nuchter. Na de inspuiting enkele uren nadien terugkomen voor beelden. Voldoende drinken. Duur 30 min.

Botdensitometrie/VFA

Niet nuchter. Zonder inspuiting. Geen recente contraststof. Duur 15 min.

Leukocytenscan

Nuchter. Na de inspuiting worden reeds enkele beelden genomen, ook na 4 à 6 uur en vaak nog eens na 24 u. Duur van de seriële beelden : telkens 15 à 30 min.

Schildklierscan

Niet nuchter. Geen recente contraststof, schildkliermedicatie of vitaminesupplementen met jodium. Duur 30 min.

Bijschildklierscan, V-Q scan, Lymfescan

Niet nuchter. Duur 1 à 2 uur.

Ventriculografie

Niet nuchter. Duur 15 min.

Myocardperfusie na stress/in rust

Telkens nuchter. Voor farmacologisch geen koffie, thee, chocolade of bananen 24 u voor het onderzoek. Graag boterhammetjes met kaas of salami meebrengen.

DaTscan

Niet nuchter. Via attest van neuroloog. Schildklierblokkade op de dag van het onderzoek. Duur 30 min.

Speekselklierscintigrafie

Niet nuchter. Duur 30 min.

Maaglediging

Nuchter. Duur 3 uur.

Divertikel van Meckel

Niet nuchter. Evtl prémedicatie voor het onderzoek met pantoprazol voorzien. Duur 1 uur.

Nierscintigrafie/DMSA-scan

Niet nuchter. Na de inspuiting 3 uur later terugkomen voor scan. Duur 30 min.

Renogram/MAG-3 scan

Niet nuchter. Voldoende prehydrateren. Duur 1 uur.

Sentinelprocedure

Borstca : '2-dagsonderzoek' met de inspuiting telkens op de middag en na 4 uur terugkomen voor de beelden. Duur 30 min.

Melanoom : '1-dagsonderzoek' met 's ochtends telkens inspuiting, aansluitend reeds beelden en na 2 uur terugkomen voor de overige beelden. Duur van de seriële beelden, telkens 30 min.

Octreoscan

Niet nuchter. Via attest van internist of chirurg. Verloopt gedurende enkele dagen. Indien sandostatine gebruik, scan laten doorgaan enkele dagen voor de volgende toediening. Evtl. laxerende medicatie wordt gevraagd in te nemen op dag 2. Duur telkens 1 uur.

SPECT/CT-scan

Gecombineerd onderzoek van functie en anatomie in 1 scan. Zonder contraststof. Niet schadelijk voor de nieren. Niet nuchter. Duur 30 min.

PET/CT-scan (UZ Gent : tel. 09/3323028)

Gecombineerd onderzoek van functie en anatomie in 1 scan veel gebruikt voor oncologie maar ook voor allerlei infectieuze en inflammatoire systeemaandoeningen.

FDG: nuchter vanaf 6 uur voor het onderzoek. Ook geen suiker innemen of suikerbaxters de dag tevoren en op dag van het onderzoek.

PSMA (specifiek voor prostaatca): nuchter vanaf 6 uur voor het onderzoek.

CT: nuchter. Bij allergie voor jodium-houdend contraststof of slechte nierfunctie, gelieve dit op voorhand te melden (vereist andere voorbereiding).

Medicatie: meeste mag u innemen met beetje water.

Voor PET/CT : op de dag van het onderzoek mag u wel van tevoren water drinken (liefst 0.5 liter).

Duur 2 uur.

Iodium-131 capsule

Nuchter. Duur 10 min.

Xofigo of Radium-223 behandeling

Botmetastasen bij prostaatca op MOC-verwijzing. 6 cycli met telkens 1 maand tussen. Op de middag. Niet nuchter. Duur 30 min.