

KAN IK EEN TRANSFUSIE WEIGEREN ?

Ja, je kan een transfusie weigeren. Hou er echter rekening mee dat er soms weinig alternatieven zijn. Voor bepaalde ingrepen of behandelingen is een transfusie essentieel en kan het moeilijk zijn de procedure veilig uit te voeren zonder de mogelijkheid van een transfusie te voorzien.

Bespreek dit tijdig en op voorhand met je arts, zodat jullie samen de best mogelijke aanpak kunnen bepalen.

Heb je nog vragen?

Aarzel niet om je vragen te bespreken met de behandelend arts of verpleegkundige!

Zij helpen je graag verder!

Voor meer info contacteer:

Paul Meuleman

Klinisch Bioloog

055 33 67 31

✉ paul.meuleman@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/LAB/379
02/02/2025
V.U. AZ Oudenaarde

Bloedtransfusie



BLOEDTRANSFUSIE

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Tijdens je verblijf in het ziekenhuis kan voor je behandeling of ingreep een (bloed-)transfusie nodig zijn. In deze brochure vind je alle belangrijke informatie over transfusie, zodat je alles rustig kan nalezen.

WAAROM EEN TRANSFUSIE ?

Bij een ernstig tekort van één of meer bloedcomponenten — zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes of plasma — kan het noodzakelijk zijn om dit tekort aan te vullen door een transfusie. De arts legt je uit waarom een transfusie in jouw geval nodig is, welke risico's eraan verbonden zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn bij het weigeren van een transfusie.

IS EEN TRANSFUSIE VEILIG ?

Een bloedtransfusie is veilig omdat:

- Enkel gezonde mensen bloed mogen doneren, en dit volledig vrijwillig en onbezoldigd doen.
- Het bloed wordt afgenomen door het Rode Kruis Vlaanderen en zorgvuldig gecontroleerd wordt op een aantal belangrijke ziekten.

VOORBEREIDING OP EEN TRANSFUSIE

Als voorbereiding op een transfusie gebeuren er een aantal laboratoriumtesten. Je bloedgroep en resusfactor worden bepaald. Dit gebeurt steeds via twee onafhankelijke bloedafnames, zodat je bloedgroep altijd dubbel gecontroleerd wordt. Daarnaast wordt ook onderzocht of je antistoffen hebt die kunnen reageren met het toegediende bloed. In het laboratorium wordt vervolgens onderzocht of het donorbloed bij jouw bloed past.

VERLOOP VAN DE TRANSFUSIE

Voor de start van de transfusie voert de verpleegkundige een aantal administratieve controles uit om te verzekeren dat de juiste bloedeenheden aan jou wordt toegediend. Zowel je polsbandje als de barcode op de bloedeenheden worden gescand. De transfusie kan pas starten als het traceersysteem bevestigt dat alles correct is, waardoor menselijke fouten worden uitgesloten.

De verpleegkundige meet je polsslag, temperatuur en bloeddruk vóór de start van de transfusie. Vervolgens wordt een ader aangeprikt met een steriele naald en via een steriele slang verbonden met de bloedeenheden. Tijdens de transfusie controleert de verpleegkundige op regelmatige tijdstippen opnieuw je polsslag, bloeddruk en temperatuur. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de transfusie op je kamer blijft.

Ondanks alle laboratoriumtesten kunnen sommige patiënten bijwerkingen ervaren zoals koorts, rillingen, jeuk of kortademigheid. Als je één van deze symptomen opmerkt, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige.

Een transfusie duurt gemiddeld 2 uur.

Als je na de transfusie het ziekenhuis mag verlaten en thuis één van de bovenstaande symptomen krijgt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je behandelend arts of huisarts!