

DAGZIEKENHUIS GERIATRIE

Je wordt verwacht aan de opnamedienst,

OPDAG

...../...../..... OMUUR

- Je hoeft NIET nuchter te zijn.
- Je schrijft je vooraf in aan het onthaal/de opnamedienst.

Voor meer info raadpleeg:

055 33 62 98

✉ geriatisch.dagziekenhuis@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

055 33 61 11

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



V.U.: AZ Oudenaarde

Geriatric



ZOLEDRONINEZUUR -INFUUS

VOOR DE BEHANDELING VAN
OSTEOPOROSE OP HET
GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

DOEL VAN DE BEHANDELING

Zoledroninezuur is een **botversterkend geneesmiddel** dat gegeven wordt **bij osteoporose waarbij het risico op breuken kan worden geminimaliseerd**. Deze behandeling wordt toegediend via een **infuus** op het (geriatrisch) dagziekenhuis.

Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die zich aan het botweefsel hechten, de botafbraak remmen, hierdoor de botdichtheid vergroten en het risico op nieuwe botbreuken verkleinen.

Doordat zoledroninezuur zich in hoge mate aan botweefsel hecht, is het **gedurende een lange periode werkzaam en volstaat een jaarlijkse behandeling. Na vijf jaar voert de arts een herevaluatie uit door middel van een DEXA- (botdensitometrie) en een VFA-meting (wervelkolomhoogtemeting).**

De arts bespreekt, indien nodig, welke verdere behandeling noodzakelijk is.

CONTRA-INDICATIES

- Een slechte nierfunctie.
- Te laag calciumgehalte in het bloed.
- Hartritmestoornissen (zonder pacemaker).
- Een tandheelkundig nazicht van het gebit is wenselijk bij herhaaldelijke toediening.

VOORBEREIDING

Voordat het infuus met zoledroninezuur kan gegeven worden, is het belangrijk dat **via een bloedafname de nierfunctie en het calciumgehalte in het bloed gecontroleerd worden**.

De bloedafname gebeurt in het ziekenhuis. Het duurt een 2-tal uur vooraleer het resultaat gekend is.

Voor de behandeling moet je extra drinken (ongeveer een halve liter is voldoende).

Neem contact op met de arts indien je **de dagen voorafgaand aan de handeling:**

- Hoge koorts, diarree of een andere aandoening met vochtverlies hebt gehad.
- Andere medicatie bent gaan gebruiken.

HET TOEDIENEN VAN ZOLEDRONINEZUUR

- Na het analyseren van de bloedafname wordt zoledroninezuur ingespoten via een infuus in een bloedvat in de arm.
- Je wordt 's ochtends rond 8.30 uur – 9 uur verwacht voor de behandeling.
- **De behandeling duur tot ongeveer 13 à 14 uur. Een middagmaal kan voorzien worden.**
- Vergeet zeker niet om **een medicatielijst** mee te brengen. De arts bekijkt dit en geeft adviezen hierover.
- Je krijgt een nieuwe afspraak mee voor het jaar nadien.

BIJWERKINGEN

Zoals bij elk medicijn dat gegeven wordt, is **een milde allergische reactie mogelijk**.

Daarnaast zijn symptomen zoals **lichte koorts en/of rillingen, spier- en gewrichtspijn en hoofdpijn mogelijk**.

Bijwerkingen treden op binnen de eerste 2 dagen na toediening en kunnen een week aanhouden.

De klachten zijn mild en van voorbijgaande aard. Dit griepaal syndroom komt het vaakst voor na het eerste infuus (bij ongeveer 1/3^{de} van de patiënten), bij de vervolgbehandelingen vermindert het risico.

Bij dergelijke klachten kan **paracetamol** ingenomen worden.