

Je wordt verwacht aan de opnamedienst,

OP/...../..... OMUUR

- Je moet NIET nuchter zijn.
- Je schrijft je vooraf in aan het onthaal.
- Het terugbetalingsattest van Aclasta® dien je 3 maanden op voorhand in bij de mutualiteit.
- Je ontvangt nadien een goedkeuring voor terugbetaling van de mutualiteit, pas daarna kan de behandeling plaatsvinden. Dit document breng je mee bij je opname.
- Heb je nog geen goedkeuring ontvangen, dan vermeld je dit aan de verpleegkundige. In dat geval wordt er een nieuwe datum gezocht.

Voor meer info raadpleeg:

Katrien Vergucht

Hoofdverpleegkundige geriatrie C2

055 33 62 99

✉ katrien.vergucht@azoudenaarde.be



AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95
info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/GER/484
Laatst aangepast op 08/09/2022
V.U.: AZ Oudenaarde



ACLASTA®-INFUUS
BEHANDELING VAN
OSTEOPOROSE IN HET
GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

Informatie voor patiënten



www.azoudenaarde.be
Volg ons op



DOEL VAN DE BEHANDELING

Aclasta® of zoledroninezuur is een botversterkend geneesmiddel dat gegeven wordt bij osteoporose waardoor het risico op breuken wordt geminimaliseerd. Deze behandeling wordt toegediend via een infuus en vindt plaats in het geriatisch dagziekenhuis.

Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die zich aan het botweefsel hechten, ze remmen de botafbraak en vergroten de botdichtheid waardoor het risico op nieuwe botbreuken wordt verkleind.

Aangezien zoledroninezuur zich in hoge mate aan het botweefsel hecht, is het gedurende een lange periode werkzaam en volstaat een jaarlijkse behandeling. Na vijf jaar voert de arts een herevaluatie uit door middel van een DEXA-meting (botdensitometrie) en een VFA-meting (wervelkolomhoogtemeting).

De arts bespreekt, indien nodig, welke verdere behandeling noodzakelijk is.

CONTRA-INDICATIES

- Een slechte nierfunctie.
- Te lage calciumconcentratie in het bloed.
- Hartritmestoornissen (zonder pacemaker).
- Een tandheelkundig nazicht van het gebit is wenselijk bij herhaaldelijke toediening.

VOORBEREIDING

Voordat het infuus met Aclasta® kan gegeven worden, is het belangrijk dat de nierfunctie en het calciumgehalte in het bloed gecontroleerd worden door middel van een bloedafname.

De bloedafname gebeurt in het ziekenhuis. Het duurt een tweetal uur vooraleer het resultaat bekend is.

Voor de behandeling moet je extra drinken (ongeveer een halve liter is voldoende).

Neem contact op met de arts indien je de dagen voorafgaand aan de handeling:

- o Hoge koorts, diarree of andere aandoeningen met vochtverlies hebt gehad.
- o Andere medicatie bent gaan gebruiken.

HET TOEDIENEN VAN ACLASTA

- Na het analyseren van de bloedafname wordt Aclasta® ingespoten via een infuus in een bloedvat in de arm.
- Je wordt rond 8.30/9 uur 's ochtends verwacht voor de behandeling.
- De behandeling duurt tot ongeveer 13/14 uur. Een middagmaal kan voorzien worden.
- Vergeet zeker niet om een lijst met jouw medicatie mee te brengen.
- Indien nodig contacteert de verpleegkundige de persoon die jou komt ophalen na de behandeling.
- Je krijgt een nieuwe afspraak mee voor het jaar nadien, met een aanvraag voor verlenging van de terugbetaling door de mutualiteit.

BIJWERKINGEN

Zoals bij elk medicijn dat gegeven wordt, is een milde allergische reactie mogelijk. Daarnaast zijn symptomen zoals lichte koorts en/of rillingen, spier- en gewrichtspijn en hoofdpijn mogelijk. Bijwerkingen treden op binnen de eerste 2 dagen na toediening en kunnen een week aanhouden. De klachten zijn mild en van voorbijgaande aard. Dit griepaal syndroom komt het vaakst voor na het eerste infuus (bij ongeveer 1/3^{de} van de patiënten), bij de vervolghandelingen neemt de kans erop af. Bij dergelijke klachten kan paracetamol ingenomen worden.